

药物与临床

格拉司琼联合地塞米松预防子宫切除术中不适反应20例

余奇劲, 周青山, 解小丽, 陈明森

武汉大学人民医院麻醉科, 430060

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-9-4 接受日期

摘要 目的 观察格拉司琼联合地塞米松预防子宫切除术中不适反应的疗效。方法ASAI-II级需行经腹子宫切除术的患者40例, 随机双盲分为对照组和治疗组各20例。治疗组手术开始前静脉滴注格拉司琼溶液50 mL(含格拉司琼3 mg), 10 min内输完, 滴注结束前即刻静脉注射地塞米松10 mg。对照组手术开始前静脉注射0.9%氯化钠注射液50 mL。观察两组患者手术前后血流动力学变化及寒战、恶心、呕吐及胸闷等不适反应情况。结果与手术开始前比较, 两组患者术中血流动力学变化差异无显著性, 治疗组恶心、呕吐发生率显著低于对照组($P < 0.01$)。寒战、胸闷等不适反应发生率亦低于对照组($P < 0.05$)。结论格拉司琼联合地塞米松能有效预防子宫切除术中寒战、恶心、呕吐及胸闷等不适反应的发生。

关键词 [格拉司琼](#) [盐酸](#) [地塞米松](#) [子宫切除术](#) [不适反应](#) [手术](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781\(2005\)05-0407-03](#)

通讯作者:

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1736KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“格拉司琼”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [余奇劲](#)
- [周青山](#)
- [解小丽](#)