

药物与临床

昂丹司琼和地塞米松对胃癌根治术后曲马多静脉自控镇痛效应的影响

楼小侃, 邹寿椿, 严美娟

浙江省人民医院麻醉科, 杭州310014

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-9-11 接受日期

摘要 目的观察昂丹司琼和地塞米松用于胃癌根治术后曲马多静脉自控镇痛时镇痛效应和术后恶心、呕吐、头昏的发生情况。方法随机抽取ASA I—III级、行胃癌根治术患者90例,按双盲法随机分为3组,术后静脉自控镇痛(PCA)。A组给予0.9%氯化钠注射液+曲马多1 000 mg; B组给予昂丹司琼8 mg+曲马多1 000 mg; C组给予地塞米松10 mg+曲马多1 000 mg。3组患者PCA按曲马多持续量10 mg,锁定时间10 min,追加量15 mg,4 h限量150 mg。观察3组患者手术结束后0~4,~8,~24,~48 h各时段疼痛程度、镇静程度、48 h曲马多用量、恶心、呕吐及头昏情况。结果C组术后镇痛效果最佳,A组次之,B组最差;48 h曲马多用量B组最大,A组与C组差异无显著性;C组恶心、呕吐患者最少,A组与B组比较差异无显著性;3组之间镇静程度、头昏差异无显著性。结论昂丹司琼不能减少胃癌根治术后曲马多静脉自控镇痛时患者术后恶心、呕吐的发生率,且会减弱其镇痛效能,加大曲马多用量;地塞米松能增强术后镇痛效果,且能减少术后恶心、呕吐的发生率。

关键词 [昂丹司琼](#) [地塞米松](#) [曲马多](#) [胃癌根治术](#) [静脉自控镇痛](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781\(2005\)07-0592-03](#)

通讯作者:

作者个人主页: 楼小侃; 邹寿椿; 严美娟

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(1379KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“昂丹司琼”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [楼小侃](#)

• [邹寿椿](#)

• [严美娟](#)