

药物与临床

地塞米松与昂丹司琼预防手术后恶心呕吐

彭丽丽¹, 王龙²

(1. 湖北省京山县人民医院外一科, 431800 ; 2. 武汉大学人民医院麻醉科, 430060)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-12-5 接受日期

摘要 (1. [摘要] 目的观察地塞米松与昂丹司琼联合用药对子宫切除术患者术后恶心呕吐的影响。方法妇科择期子宫切除术患者60例, 随机分成3组, 每组20例。昂丹司琼组术毕静脉推注昂丹司琼8 mg; 联合用药组术毕静脉推注昂丹司琼8 mg和地塞米松10 mg; 对照组术毕静脉给予等量0.9%氯化钠溶液。术后观察24 h内恶心、呕吐发生情况并询问患者的主观感受。结果与对照组比较, 昂丹司琼组和联合用药组均能有效降低术后恶心呕吐发生率 ($P < 0.05$); 与昂丹司琼组比较, 联合用药组抗术后恶心、呕吐的效果更佳 ($P < 0.05$)。结论地塞米松与昂丹司琼联合用药对手术后引起的恶心、呕吐具有良好的预防和治疗作用。

关键词 (1. [关键词] [地塞米松](#); [昂丹司琼](#); [恶心](#); [呕吐](#))

分类号 [R975.4](#)

DOI:

对应的英文版文章: [\(1. 1004 0781 \(2007\) 12 1467 02\)](#)

通讯作者:

彭丽丽

作者个人主页: [彭丽丽¹](#); [王龙²](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(OKB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中包含“\(1. \[关键词\] 地塞米松; 昂丹司琼; 恶心; 呕吐\)”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [彭丽丽](#)

• [王龙](#)