

麻醉科用药专栏

静脉注射奈福泮对妇科腹腔镜手术患者的超前镇痛效应

常向阳¹, 姚明², 王立中¹, 胡小霞¹, 夏丰¹

(1. 浙江省嘉兴市妇幼保健院, 嘉兴市市立三一医院麻醉科, 嘉兴314001; 2. 嘉兴医学院附属第二医院麻醉科, 嘉兴314000)

收稿日期 2008-10-5 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 观察静脉注射奈福泮对妇科腹腔镜手术患者的超前镇痛效应及其安全性. 方法 将80例拟在全身麻醉下行妇科腹腔镜手术的患者随机均分为4组, 每组20例. 对照组 (C组) 静脉注射0.9%氯化钠注射液10 mL, N1, N2和N3组分别静脉注射奈福泮0.4, 0.6, 0.8 mg·kg⁻¹, 药液均用0.9%氯化钠注射液稀释到10 mL. 所有患者均以咪达唑仑、丙泊酚、芬太尼、琥珀胆碱麻醉诱导, 术中以丙泊酚和维库溴铵麻醉, 并吸入异氟烷维持麻醉. 观察术毕苏醒时间, 术后0.5, 3, 6, 12, 24 h疼痛视觉模拟评分 (VAS), 不良反应的发生率及术后24 h内镇痛药的需求. 结果 N1、N2、N3组术后3, 6, 12 h三个时间点的VAS评分低于C组 (P<0.05或P<0.01). N2、N3组术后3, 6 h两个时间点的VAS评分低于N1组 (P<0.05). N2、N3组术后镇痛药的需求少于C组 (P<0.05). N3组术后头晕的发生率高于C组 (P<0.05). 结论 静脉注射奈福泮对妇科腹腔镜术后疼痛具有较好的超前镇痛效应; 其中术前奈福泮0.6 mg·kg⁻¹静脉注射可有效缓解术后疼痛, 且副作用较少.

关键词 [奈福泮](#) [手术](#), [腹腔镜](#) [镇痛](#), [超前](#)

分类号 [R713](#) [R969.4](#)

DOI: 10.3870/yydb.2009.04.022

对应的英文版文章: [2009-4-465](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(645KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\] \(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献 \[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“奈福泮”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [常向阳](#)
 - [姚明](#)
 - [王立中](#)
 - [胡小霞](#)
 - [夏丰](#)