

麻醉科用药专栏

普瑞巴林联合曲马多治疗急性带状疱疹疼痛的临床观察

于卫, 黄觉升, 林根, 马薇涛, 李红英

[广东省人民医院(广东省医学科学院)麻醉科, 广州510080]

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要

摘要 目的观察普瑞巴林联合曲马多治疗中重度急性带状疱疹疼痛的临床疗效和安全性。方法急性带状疱疹患者45例, 随机分为3组, 各15例。T组: 曲马多缓释片初始剂量100 mg, q12 h, po; P组: 普瑞巴林胶囊初始剂量75 mg, bid, po; TP组: 曲马多缓释片初始剂量50 mg, q12 h, po, 普瑞巴林胶囊剂量75 mg, bid, po。根据疼痛程度变化调整药物剂量, 疗程4周。随访疼痛评分(NRS)、睡眠质量评分和曲马多使用量, 并行综合评估。结果3组患者治疗后NRS评分均显著降低, TP组的NRS评分下降更为显著; 睡眠质量明显改善; TP组和T组患者疼痛缓解显效率高于P组。TP组曲马多使用量低于T组。结论普瑞巴林和曲马多镇痛可能存在协同作用, 两者联合治疗急性带状疱疹疼痛具有多模式镇痛的优点。

关键词

[关键词普瑞巴林; 曲马多; 带状疱疹; 疼痛](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2012\) 09-1147-03](#)

通讯作者:

作者个人主页:

于卫; 黄觉升; 林根; 马薇涛; 李红英

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1226KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“
关键词普瑞巴林; 曲马多; 带状疱疹;
疼痛”的 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [于卫](#)
- [黄觉升](#)
- [林根](#)
- [马薇涛](#)
- [李红英](#)