

临床医学

术中应用不同剂量曲马多对雷米芬太尼复合麻醉苏醒期VAS评分的影响

孟凌新,周静,于铁英

中国医科大学附属盛京医院麻醉科,辽宁 沈阳 110004

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的: 探讨术中应用不同剂量的曲马多对雷米芬太尼复合全麻苏醒期镇痛效果VAS评分的影响。方法: 60例ASA I~II级 静吸复合全麻下行下腹部肿瘤手术(包括结肠癌、直肠癌)的患者随机分为3组: I组 曲马多1.0 mg/kg、II组 曲马多2.0 mg/kg、III组 曲马多3.0 mg/kg。各组分别于术毕前40 min静注给药。手术结束后滞留30 min, 观察患者恢复质量(清醒时间、拔管时间和拔管后0 min、20 min的平均动脉压、心率及VAS评分)和并发症(恶心、呕吐、嗜睡、呼吸抑制等)。结果: I组和II组的VAS评分显著低于III组($P < 0.01$)。清醒时间、拔管时间和拔管后平均动脉压、心率的差异无显著性($P > 0.05$)。III组的恶心、呕吐发生率较高。结论: 雷米芬太尼复合全身麻醉术中, 曲马多应用剂量以2.0mg/kg为好。

关键词 [曲马多](#); [雷米芬太尼](#); [镇痛](#)

分类号 [R971](#)

DOI:

通讯作者:

孟凌新 menglx@cmu2h.com

作者个人主页: [孟凌新](#); [周静](#); [于铁英](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (308KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中包含“曲马多; 雷米芬太尼; 镇痛”的相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

· [孟凌新](#)

· [周静](#)

· [于铁英](#)