

## 药物不良反应

### 口服米非司酮致变态反应1例

刘秀娥,林常红,贾玉礼

(山东省威海市文登中心医院手术室,264400)

收稿日期 2007-1-25 修回日期 网络版发布日期 2007-10-9 接受日期

**摘要** 患者,29岁,身体健康.2006年5月24日,因早孕35 d,欲行非手术流产,服用米非司酮 25 mg,bid,2006年5月24日下午18:00再次服用米非司酮25 mg,约30 min后,觉双耳有烧灼奇痒感,双耳潮红,均匀散在麻疹样皮疹,高于皮肤,面部烧灼感,只见潮红,无疹点,相继颈部、胸腹部、背部、双上肢、双腿部均出现皮肤潮红,密集、均匀、大小相等的麻疹样皮疹出现,高于皮肤,患处瘙痒难忍,胸部憋闷,似有重物压迫之感.急给注射地塞米松磷酸钠注射液(氟美松)10 mg,口服氯苯那敏4 mg,tid.约10 min后患者胸闷渐减,次日胸憋闷、重物压迫感消失,疹点变暗.3 d后皮肤潮红完全消失,皮疹变紫且明显回缩.5 d后渐消而愈.患者系首次应用米非司酮,服用前后未用其他药物,第2次口服后,出现变态反应症状,停用米非司酮后,经调治症状消失而愈,系服用米非司酮所致变态反应无疑.

**关键词** [米非司酮](#) [变态反应](#)

**分类号** [R984](#) [R593.1](#)

**DOI:**

对应的英文版文章:[W270126](#)

通讯作者:

作者个人主页:刘秀娥;林常红;贾玉礼

## 扩展功能

### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1211KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

### 服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

### 相关信息

- ▶ [本刊中 包含“米非司酮”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [刘秀娥](#)
- [林常红](#)
- [贾玉礼](#)