

## 药物与临床

### 地奥司明用于痔外剥内扎术后48例

贺平, 谢敏江, 张桢, 何红艳

(成都肛肠专科医院、中国西部PPH技术培训中心, 610072)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** [摘要] 目的探讨地奥司明在痔外剥内扎术后应用的有效性。方法将87例痔外剥内扎术后患者分成2组, 治疗组48例, 术后常规口服地奥司明片1.5 g, q12 h; 对照组39例, 口服安慰药, 共7 d。以症状评分方式观察两组的治疗效果。结果治疗组与对照组术后24 h的症状、体征总得分比较, 差异无显著性; 术后48 h及术后第7天, 治疗组优于对照组。结论痔外剥内扎术后常规应用地奥司明片可以改善术后肛门局部微循环, 促进痔静脉回流, 有利于预防、减轻痔外剥内扎术后的水肿、出血以及坠胀等并发症。

**关键词** [地奥司明](#); [痔](#); [术后](#)

**分类号** [R972.9](#); [R657.18](#)

**DOI:**

对应的英文版文章: [1004 0781 \(2008\) 09 1081 02](#)

**通讯作者:**

贺平

作者个人主页: [贺平](#); [谢敏江](#); [张桢](#); [何红艳](#)

## 扩展功能

### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1186KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献 \[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

### 服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

### 相关信息

- ▶ [本刊中 包含“地奥司明; 痔; 术后”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [贺平](#)
- [谢敏江](#)
- [张桢](#)
- [何红艳](#)