

药物与临床

氯吡格雷与阿司匹林联合治疗 非ST段抬高急性冠脉综合征35例

宗文霞, 林琍, 何静

(湖北省中山医院心内科, 武汉430033)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 [摘要] 目的观察氯吡格雷和阿司匹林联合治疗非ST段抬高急性冠脉综合征(NSTEACS)的近期疗效。方法NSTEACS患者70例,随机分为两组,对照组35例:给予阿司匹林及低分子肝素治疗,并根据病情给予硝酸酯类、 β 受体阻滞药、钙拮抗药、血管紧张肽转化酶抑制药(ACEI)、他汀类调脂药等常规药物治疗;治疗组35例:在给予阿司匹林、低分子肝素及常规治疗的同时即刻口服氯吡格雷300 mg,随后每天75 mg,连续14 d,观察两组患者的临床疗效及不良反应。结果治疗组有效率85.7%,对照组有效率62.9%,两组间差异有显著性($P < 0.05$);两组治疗前后心绞痛发作次数减少,心肌缺血时间缩短,硝酸甘油消耗量减少($P < 0.05$),且两组治疗后上述各项指标间差异均有显著性,治疗组优于对照组($P < 0.05$);两组治疗前后凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血酶原时间(APTT)、血小板计数(PLT)相比差异无显著性。结论NSTEACS患者在应用阿司匹林常规治疗的基础上加用氯吡格雷近期疗效肯定,能有效控制心绞痛发作,安全性好。

关键词 [氯吡格雷](#); [阿司匹林](#); [冠脉综合征,急性,非ST段抬高](#)

分类号 [R973.2](#); [R541.4](#)

DOI: [10.3870/yydb.2009.03.020](#)

对应的英文版文章: [2009-3-325](#)

通讯作者:

作者个人主页: 宗文霞; 林琍; 何静

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1178KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“氯吡格雷;阿司匹林;冠脉综合征,急性,非ST段抬高”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [宗文霞](#)
- [林琍](#)
- [何静](#)