

药物与临床

地奥司明与马应龙麝香痔疮膏联用治疗血栓性痔92例

彭文, 刘宗荣, 龚颖生, 丘秀娟, 邵明

(广东省深圳市第六人民医院肛肠科, 518052)

收稿日期 2009-10-6 修回日期 2010-2-10 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 比较地奥司明与马应龙麝香痔疮膏联合或单用治疗血栓性痔的临床效果. 方法 将血栓性痔患者206例按治疗用药情况分为联合药物组92例, 地奥司明组52例, 马应龙麝香痔疮膏组62例. 地奥司明组给予地奥司明片, 第1~4天, 每次2片, po, tid, 第5~7天改为每天2次, 总共治疗7 d; 马应龙麝香痔疮膏组给予马应龙麝香痔疮膏, 早晚各1支, 部分外涂, 部分挤入肛内. 联合药物组给予地奥司明片和马应龙麝香痔疮膏, 用法和疗程与单用药组相同. 分别比较治疗3, 7 d后症状改善情况. 结果 联合用药组3和7 d总有效率分别为80.4%和91.3%, 地奥司明组分别为57.7%和69.2%, 马应龙麝香痔疮膏组分别为64.5%和74.2%. 联合用药组与其他两组比较, 差异有显著性 ($P < 0.05$). 结论 地奥司明联合马应龙麝香痔疮膏应用治疗血栓性痔疗效显著, 优于单独用药.

关键词 [地奥司明](#) [马应龙麝香痔疮膏](#) [痔](#), [血栓性](#)

分类号 [R982](#) [R657.1](#)

DOI: [10.3870/yydb.2010.07.019](#)

对应的英文版文章: [2010-7-887](#)

通讯作者:

作者个人主页: 彭文; 刘宗荣; 龚颖生; 丘秀娟; 邵明

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(1112KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“地奥司明”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [彭文](#)
- [刘宗荣](#)
- [龚颖生](#)
- [丘秀娟](#)
- [邵明](#)