

● 电子杂志
● 高影响力论文
● 友情链接
访问总次数

今日访问

当前在线

张志辉, 杨仕明, 贾树蓉, 陈陵, 房殿春. 特发性门脉高压症20例.
世界华人消化杂志 2004年 6月;12(6):1489-1492

特发性门脉高压症20例

张志辉, 杨仕明, 贾树蓉, 陈陵, 房殿春.

400038, 重庆市, 中国人民解放军第三军医大学西南医院全军消化专科中心. shimingyang@yahoo.com

目的: 探讨特发性门脉高压症(IPH)的临床特征及诊治方法. 方法: 回顾性分析我院收治的20例特发性门脉高压患者的临床资料. 结果: 本组患者中男11例, 女9例, 发病年龄为1-65 (15.1+/-12.6岁), 病程27 d-23 a不等; 临床表现主要为反复呕血、黑便(18/20), 脾大(20/20); HBsAg阳性1例, 所有患者肝功能各项指标基本正常; 电子胃镜/食管吞钡检查食管(胃底)静脉曲张18例; 彩超检查发现门静脉结构变化19例(其中门静脉及其分支海绵样变12例, 门静脉内径狭窄、管壁增厚、正常结构消失10例, 门静脉主要分支闭塞或缺如5例); 2例患者行门静脉造影术检查, 均发现门静脉结构变化, 与彩超检查结果吻合; 14例患者行外科手术治疗, (分流和/或断流术13例, 肝移植1例), 术中发现所有患者肝脏形态、大小基本正常, 14例病理检查发现所有患者均存在门脉显微结构的改变, 除1例有假小叶形成外, 其余均无肝硬化表现. 20例患者均随访, 回访15例, 回访率75%, 回访结果显示, 手术治疗的9例患者中, 术后再出血2例, 再出血率为22.2%, 保守治疗的6例患者, 出院后5例再出血, 再出血率为83.3%, 明显高于手术组($\chi^2 = 6.482, P < 0.05$). 结论: 同国外相比, 本组IPH患者男性多于女性, 且发病年龄较小; 临床上凡发现年龄小、以反复呕血、黑便、脾功能亢进、食管胃底静脉曲张, 而肝功能基本正常的原因不明的门脉高压患者, 要高度怀疑本病的可能, 彩超检查对本病的诊断具有重要意义, 针对上消化道出血行胃镜治疗术、门体分流和/或断流术可明显降低再出血的机率.

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www.wjgnet.com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司