



English Version | Contact us

首页	组织机构	院士信息	咨询与研究	院士增选	学术交流	国际交流合作	院士行	院地合作
院士建议	院士风采	出版工作	《中国工程科学》	光华工程科技奖	院机关工作	院大事记	综合信息	

全文搜索 搜索范围 站内搜索 搜索

您现在的位置: 首页 / 院士建议 / 院士谈科技 / 正文

钟南山：公众对慢阻肺存在两大认识误区

2006年11月08日 08:31:56 来源：新华网

新华网北京11月7日电（记者朱玉）世界慢阻肺日来临之际，中国工程院院士、广州市呼吸疾病研究所所长钟南山院士近日指出，慢性阻塞性肺病的危害性在我国尚未得到充分的认识，公众对此病存在两大认识误区，导致近年来其发病率及死亡率持续增加。

慢性阻塞性肺病其实并不陌生，它包括常见的慢性支气管炎和肺气肿，是一种逐渐削弱患者呼吸功能的破坏性肺部疾病。根据钟南山院士领衔的一项流行病学调查，目前我国40岁以上人群慢阻肺的患病率较高。

钟南山院士认为，50%的患者根本没意识到自己患上慢阻肺。针对这一误区，钟南山建议：45岁以上人群应像量血压一样，定期到医院进行肺功能检查。高危人群，如抽烟人士、有家族病史者更应“提高警觉”，应从40岁就开始检查。肺功能检查过程并不复杂，价格也不贵。

钟南山说，典型的慢阻肺发展三部曲是：开始病症通常不被注意，患者的肺功能已开始下降。一旦症状出现，已经到了慢阻肺的中晚期，往往错失了治疗最佳时机。急性发病时，患者肺部功能将失去一半，严重者更会因呼吸衰竭而死亡。

针对患者不能坚持规律治疗这一误区，钟南山院士强调，慢阻肺难治的一个主要原因，是许多患者未能坚持规律治疗。他说，很多人会在一个阶段治疗之后中断继续治疗，以为只要不发作就没事了。事实上，每次病情加重都对心肺功能造成“叠加”损害，导致患者健康状况恶化。所以即使是处于稳定期的患者也应该坚持治疗，适度进行康复训练。

他表示，目前医学上尚未有彻底治愈慢阻肺的手段，关键的手段只有一个——减少发作。

关闭窗口

关于我们 | 网站地图 | 联系方式 | 招聘信息 | 广告业务 | 收藏本站 | 设为首页

Copyright © 2006 中国工程院
ICP备案号: 京ICP备05023557号

地址: 北京市西城区冰窖口胡同2号
邮政信箱: 北京8068信箱
邮编: 100088
电话: 8610-59300000 传真: 8610-59300001
网站管理电话: 8610-59300292
Email: bgt@cae.cn