



吴有军1, 单成祥1, 宗敏2, 仇明1*, 仇明, 单成祥, 宗敏. 回肠憩室内异位胰腺并发下消化道大出血一例报告[J]. 第二军医大学学报, 2007, 28(12): 1323-1323

回肠憩室内异位胰腺并发下消化道大出血一例报告 [点此下载全文](#)

[吴有军1](#) [单成祥1](#) [宗敏2](#) [仇明1*](#) [仇明](#) [单成祥](#) [宗敏](#)

1. 第二军医大学长征医院微创外科中心, 上海 200003; 2. 长征医院麻醉科, 第二军医大学附属长征医院微创外科中心, 第二军医大学附属长征医院微创外科中心, 第二军医大学附属长征医院麻醉科

基金项目:

DOI: 10.3724/SP.J.1008.2007.01323

摘要:

1临床资料患者男性, 25岁, 反复便血3个月。患者3个月前无明显诱因出现便血, 伴失血性休克, 在我院消化内科经保守治疗出血停止出院。入院前2 d再次便血, 伴头晕、乏力, 无呕血。查体: 体温36.5℃, 血压100/60 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa), 脉搏80次/min。贫血貌, 皮肤黏膜无黄染。腹部平坦, 无腹壁静脉曲张, 全腹软, 未及包块, 无压痛、反跳痛, 肠鸣音亢进。辅助检查: 血红蛋白66 g/L, 胃镜提示慢性浅表性胃炎, 结肠镜提示慢性结肠炎。考虑小肠出血。因出血为间断性且已给予止血治疗, DSA阳性率不高, 故行胶囊内镜检查, 见回肠末端一隆起性病变, 伴活动性出血(图1A)。初步诊断: 小肠占位、性质待查。经积极术前准备在全麻下行腹腔镜探查术, 术中见距回盲瓣约30 cm回肠壁上有一憩室, 长约7 cm, 直径约1.3 cm, 憩室盲端可见一圆形肿块, 直径约1 cm。余脏器未见异常。以无损伤抓钳牵起憩室, 用内镜下切割缝合器于其根部将憩室切除。病理报告为异位胰腺组织(图1B)。术后恢复顺利, 随访6个月未再出血。[第一段]

关键词: [回肠](#) [憩室](#) [胰腺](#) [胃肠出血](#)

Lower gastrointestinal bleeding caused by ectopic pancreas in ileum diverticula: a case report [Download Fulltext](#)

[Qiu Ming](#) [Shan Cheng-xiang](#) [Zong Min](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

您是第102124位访问者

主办单位: 第二军医大学 出版单位: 《第二军医大学学报》编辑部

单位地址: 上海市翔殷路800号 邮编: 200433 电话: 021-25074340 (25074341, 25074345)-824 传真: 021-25074344 E-mail: bxue@smmu.edu.cn

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计