



您当前的位置是: 首页 >> 资料库 >> 2005期 >> 第2期

不同方法置胃管病人不良反应的观察

罗小娟 谢佩珠

(佛山市第二人民医院外二科 佛山市第二人民医院外二科 广东佛山 广东佛山)



资料库



阅读全文
READ THE FULL TEXT

浏览次数 242667

2007年		
第1期	第2期	第3期
第4期		
2006年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2005年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2004年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2003年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

[摘要] 目的减轻留置胃管病人的痛苦, 提高一次置管成功率, 减少病人不良反应。方法采用双盲法将150例消化外科需留置胃管的病人随机分为3组, 分别为传统方法置管、置管前5min鼻咽部喷射2%利多卡因及置管前5min鼻咽部喷射注射用水后置管, 比较3组病人出现恶心、呕吐、呛咳、流泪等不良反应, 引出血性胃液情况及一次置管成功率等指标。结果3组病人引起不良反应及一次置管成功率等指标分别经统计学处理有显著性差异($P < 0.05$ 或 $P < 0.01$), 说明利多卡因组优于其他2组。结论置胃管前5min鼻咽部喷射利多卡因表面麻醉, 可明显减轻病人的痛苦反应, 提高一次置管成功率, 降低置管并发症, 有临床推广价值。

[关键词] 利多卡因 留置胃管 不良反应

[中国分类号] [文献标识码] [文章编号]

()

[Key words]

【关闭窗口】

2002年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2001年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2000年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

COPYRIGHT © 护理学报 地址：广州市广州大道北1838号 技术支持：网天科技

您是第 **300386** 位访客