

● 电子杂志  
● 高影响力论文  
● 友情链接  
访问总次数

今日访问

当前在线

黄美兰, 冉志华, 童锦禄, 陆丽华, 萧树东. 布地奈德和传统糖皮质激素直肠用药治疗远端溃疡性结直肠炎. 世界华人消化杂志 2008年 1月;16(3):326-331

布地奈德和传统糖皮质激素直肠用药治疗远端溃疡性结直肠炎

黄美兰, 冉志华, 童锦禄, 陆丽华, 萧树东.

200001, 上海市, 上海交通大学医学院附属仁济医院消化科, 上海市消化疾病研究所. z-ran@online.sh.cn

目的: 系统分析布地奈德和传统糖皮质激素直肠局部用药治疗远端溃疡性结直肠炎的疗效, 客观评价两者疗效及副作用. 方法: 通过Medline、Embase及中国生物医学文献数据库检索有关布地奈德和传统糖皮质激素直肠局部用药治疗远端溃疡性结直肠炎疗效的随机对照试验及相关文献, 采用RevMan4.2.8进行荟萃分析. 结果: 按照入选标准, 共有6项研究被纳入本荟萃分析. 结果显示, 布地奈德直肠局部用药治疗远端溃疡性结直肠炎与传统糖皮质激素相比在内镜下、病理组织学及临床疗效方面都无显著差异 (OR = 1.21, 95% CI: 0.84-1.74, P>0.05; OR = 1.08, 95% CI: 0.75-1.57, P>0.05; OR = 1.09, 95% CI: 0.75-1.58, P>0.05); 但对机体内源性皮质醇产生的抑制影响比传统糖皮质激素要小, 差异有显著性 (OR = 0.17, 95% CI: 0.06-0.53, P<0.05). 结论: 布地奈德与传统糖皮质激素直肠局部用药治疗远端溃疡性结直肠炎的疗效相似, 但由于其对机体内源性皮质醇的抑制程度比传统糖皮质激素较轻, 故可能在应用上更优于后者.

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www.wjgnet.com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司