

李春涛, 张焯. 2型糖尿病患者上消化道症状与胃排空的超声检测.
世界华人消化杂志 2008年 8月;16(23):2653-2655

2型糖尿病患者上消化道症状与胃排空的超声检测

李春涛, 张焯.

101300, 北京市, 中国医科大学北京顺义医院消化内分泌科. lichuntao33@126.com

目的: 总结分析2型糖尿病患者的上消化道症状, 并检测其胃的液体排空功能. 方法: 2005-11/2007-10我院门诊和住院的2型糖尿病患者411例, 统计上消化道症状的出现率及其严重程度评分, 饮水后30、60、90 min时, 应用超声检测胃的排空率, 与264例正常人的对照组进行比较分析. 结果: 411例患者中有上消化道症状者, 高于对照组中相应症状的发生率(60.3% vs 16.7%, $P < 0.01$), 症状中最常见的是餐后饱胀(77.9%)和腹胀暖气(61.1%), 症状严重度的评分也高于对照组($P < 0.01$); 30、60、90 min时, 糖尿病患者胃的排空较对照组显著延缓($P < 0.01$). 糖尿病患者中60 min胃排空正常者与延缓者间只有早饱和恶心呕吐症状的发生率和严重程度评分有显著差异($P < 0.05$). 结论: 2型糖尿病患者上消化道症状有较高的发生率, 其原因可能与胃排空延缓有关. 超声法检测糖尿病患者的胃液排空功能简便易行, 具有一定的临床应用价值.

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http://www.wjgnet.com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司

● 电子杂志
● 高影响力论文
● 友情链接
访问总次数

今日访问

当前在线