

● 电子杂志
● 高影响力论文
● 友情链接
访问总次数

今日访问

当前在线

任习芳, 姚诒华, 郑宗军, 龚发良. 肝硬化并门脉高压性肠病42例.
世界华人消化杂志 2008年 12月;16(36):4115-4117

肝硬化并门脉高压性肠病42例

任习芳, 姚诒华, 郑宗军, 龚发良.

443000, 湖北省宜昌市, 湖北省宜昌市第一人民医院消化内科. rxfcc@163.com

目的: 探讨门脉高压性肠病与肝功能分级、门脉高压性胃病、食管静脉曲张的关系. 方法: 对42例肝硬化患者进行常规结肠镜检查, 跟踪随访两年, 并对其并发PHC进行分析. 结果: 42例肝硬化患者中, PHC发生率52%, 食管静脉曲张发生率为79%, 其中行食管静脉曲张硬化剂及套扎治疗者分别为26%、38%. PHG发生率为55%. 随访跟踪两年, 发现51%的患者发生下消化道出血. PHC发病率没有随肝功能分级加重($\chi^2 = 2.64, P > 0.05$)、食管静脉曲张程度增加($\chi^2 = 1.84, P > 0.05$), 下消化道出血与PHC发病率存在明显相关性($\chi^2 = 13.14, P < 0.05$). 结论: 肝硬化患者PHC发病率没有随肝功能分级、食管静脉曲张严重程度增加而上升, 但PHC是出现下消化道出血的重要因素.

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www.wjgnet.com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司