

● 电子杂志
● 高影响力论文
● 友情链接
访问总次数

今日访问

当前在线

陈维娜, 蓝宇, 柯美云. 不同状态糖尿病患者胃电活动的特点.
世界华人消化杂志 2009年 4月;17(10):1033-1037

不同状态糖尿病患者胃电活动的特点

陈维娜, 蓝宇, 柯美云.

100035, 北京市西城区新街口东街31号, 北京积水潭医院消化科, 北京大学医学部第四临床医学院. lanyu-mail@sohu.com

目的: 观察不同状态糖尿病患者的胃电活动特征, 探讨糖尿病胃电紊乱的发展规律. 方法: 2005-11/2006-05北京协和医院就诊的糖尿病患者54例, 根据糖尿病并发症及上消化道症状的有无分为3组: 无并发症及上消化道症状组, 有并发症而无明显上消化道症状组, 有并发症及明显上消化道症状组. 记录空腹30 min和餐后60 min的体表胃电活动. 结果: 糖尿病患者胃电节律异常发生率为74.1%. 餐前胃电活动表现为: 正常节律(46.3%)、胃动过缓(31.5%)、无节律(14.8%)、胃动过速(7.4%); 餐后胃电活动表现为: 胃动过缓(37%)、正常节律(35.2%)、无节律(20.4%)、胃动过速(7.4%). 有并发症及上消化道症状组的PR值显著高于无并发症及上消化道症状组(1.07 ± 1.17 vs 0.93 ± 0.14 , $P = 0.022$). 有并发症及上消化道症状者早饱症状的严重程度和PR值负相关($r = -0.535$, $P = 0.040$). 结论: 糖尿病患者胃电节律紊乱以胃动过缓最常见, 不同状态糖尿病患者的胃电活动存在差异.

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www.wjgnet.com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司