

● 电子杂志
● 高影响力论文
● 友情链接
访问总次数

今日访问

当前在线

曾黎明, 陈村龙, 智发朝. 组织黏合剂Histoacryl治疗胃静脉曲张活动性出血的疗效.
世界华人消化杂志 2003年 6月;11(6):855-856

组织黏合剂Histoacryl治疗胃静脉曲张活动性出血的疗效

曾黎明, 陈村龙, 智发朝.

525011, 广东省茂名市, 广东医学院第三附属医院消化内科. zliming@21cn.com

目的:观察内镜下组织黏合剂Histoacryl曲张静脉内注射对胃静脉曲张活动性出血的疗效. 方法:把42例经紧急胃镜确诊为胃静脉曲张活动性出血的患者随机分成两组, 分别接受内镜曲张静脉内注射Histoacryl和三腔两囊管填塞压迫止血治疗, 治疗期间观察两组患者止血时间、止血率、再出血率、输血率、手术率、死亡率等情况. 结果:两组患者的止血时间分别为3.8+/-1.3 h、13.6+/-8.7 h, 有显著性差异(P<0.05); 止血率分别为100%(22/22)、90.0%(18/20), 差异无显著性(P>0.05); 再出血率分别为4.5%(1/22)、40.0%(8/20), 有显著差异(P<0.05); 输血率分别为50.0%(11/22)、80.0%(16/20), 有显著性差异(P<0.05); 手术率分别为4.5%(1/22)、50.0%(10/20), 有显著性差异(P<0.05); 死亡率分别为0(0/22)、25.0%(5/20), 有显著性差异(P<0.05). 结论:内镜下Histoacryl曲张静脉内注射比三腔两囊管填塞压迫止血更快, 疗效更好.

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www. wjgnet. com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司