

谢勇, 吕农华, 黄德强, 陈江, 徐萍, 王崇文. 胃液抗Hp IgA测定对Hp根除治疗效果的判断.  
世界华人消化杂志 2003年 11月;11(11):1818-1820

胃液抗Hp IgA测定对Hp根除治疗效果的判断

谢勇, 吕农华, 黄德强, 陈江, 徐萍, 王崇文.

330006, 江西省南昌市永外正街17号, 江西医学院一附院消化研究所. xieyong-med@163.net

目的: 为探讨胃液抗Hp IgA测定对Hp根除治疗效果判断的价值. 方法: 采用间接ELISA法检测了65患者Hp根除前后胃液抗Hp IgA. 结果: (1)Hp根除后胃液抗Hp IgA含量显著低于治疗前(0.465和0.173,  $P<0.001$ ); (2)Hp根除后胃液抗Hp IgA阳性率由治疗前的94.29%降至22.86% ( $P<0.001$ ); (3)Hp未根除者及Hp阴性者其胃液中抗Hp IgA在治疗前后无显著差异( $P>0.05$ ). 结论: 胃液中抗HpIgA含量能反映当时胃内Hp感染情况, 可作为Hp是否根除的判断标志.

● 电子杂志  
● 高影响力论文  
● 友情链接  
访问总次数

今日访问

当前在线

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www.wjgnet.com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司