

● 电子杂志
● 高影响力论文
● 友情链接
访问总次数

今日访问

当前在线

黄力言, 龙家衡. 雷尼替丁加连芪汤根除胃窦癌术后幽门螺杆菌疗效观察.
世界华人消化杂志 2004年 6月;12(6):1483-1485

雷尼替丁加连芪汤根除胃窦癌术后幽门螺杆菌疗效观察

黄力言, 龙家衡.

524002, 广东省湛江市人民大道中2号, 广东省农垦中心医院消化内科.

目的: 观察用雷尼替丁加连芪汤根除胃癌胃大部分切除术后残胃幽门螺杆菌(*Helicobacter Pylori*, Hp)感染的疗效及其安全性.
方法: 将胃癌胃大部分切除术后残胃Hp感染患者分为两组, 治疗组56例, 用雷尼替丁加连芪汤治疗, 疗程为4 wk; 对照组57例, 用奥美拉唑、克拉霉素、甲硝唑三联治疗, 疗程1 wk. 结果: 两组Hp根除率: 治疗组和对照组, 按方案(PP)分析分别为: 81.82% (45/54)、79.25% (42/53), 按意图治疗(ITT)分析分别为80.36% (45/56)、73.68% (42/57). 两组药物不良反应(ADR)发生率为9.26% (5/54)、43.40% (23/53), $P < 0.01$. 结论: 雷尼替丁加连芪汤与质子泵抑制剂(PPI)为基础的三联疗法根除残胃Hp感染均有良好效果, 但雷尼替丁加连芪汤ADR更少, 依从性更佳. 因此雷尼替丁加连芪汤是根除残胃Hp较好的治疗方法.

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www.wjgnet.com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司