

药物与临床

替米沙坦联合尿毒清颗粒治疗早期糖尿病肾病32例

王福翎¹, 黄卓尧², 伍军伟³

(广西壮族自治区桂平市人民医院1.肾内科; 2.中医科; 3.内分泌科, 537200)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 [摘要] 目的探讨替米沙坦联合尿毒清颗粒治疗早期糖尿病肾病的疗效。方法将64例早期糖尿病肾病(DN)患者随机分为对照组和治疗组, 每组32例。两组患者均按糖尿病常规治疗, 对照组给予替米沙坦40 mg/d, 1, po, qd; 治疗组在对照组治疗的基础上联用尿毒清颗粒每次5 g, 温水冲服, 白天3次, 睡前1次, 用药间隔不超过8 h。疗程均为6个月。结果 ①与治疗前比较, 治疗组治疗后血清总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)明显下降($P < 0.05$), 高密度脂蛋白(HDL)明显上升($P < 0.05$), 对照组上述指标变化不明显($P > 0.05$); ②两组尿微量清蛋白排泄率(UAER)均显著改善($P < 0.05$)。治疗组较对照组疗效更显著($P < 0.05$), 血肌酐(SCr)明显下降($P < 0.05$), 而对照组指标变化不明显($P > 0.05$); ③两组治疗后空腹血糖(FBG)、血尿素氮(BUN)、血清蛋白(Alb)均无明显变化($P > 0.05$)。结论替米沙坦联合尿毒清颗粒治疗早期糖尿病肾病疗效确切。

关键词 [替米沙坦](#); [尿毒清颗粒](#); [肾病](#); [糖尿病](#)

分类号 [R972.4](#); [R587.2](#)

DOI: 10.3870/yydb.2009.09.018

对应的英文版文章: [2009-9-1152](#)

通讯作者:

作者个人主页: [王福翎¹](#); [黄卓尧²](#); [伍军伟³](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(539KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“替米沙坦; 尿毒清颗粒; 肾病, 糖尿病”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [王福翎](#)
- [黄卓尧](#)
- [伍军伟](#)