

药物制剂与药品质量控制

丹参酮 II A 治疗缺血性卒中急性期疗效评价*

马丽虹¹, 李冬梅², 李可建¹

1. 山东中医药大学针灸推拿学院, 济南250355; 2. 济南市中医医院老干部科, 250011

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的系统评价丹参酮 II A 治疗缺血性卒中急性期的临床疗效与安全性。方法搜集丹参酮 II A 治疗缺血性卒中急性期随机对照试验文献, 筛选合格研究, 采用 Jadad 评分法评价文献质量, 运用异质性检验、Meta 分析、敏感性分析等方法统计相关数据。结果纳入符合标准研究 9 项。Meta 分析结果显示, 总有效率比较合并 RR (99% CI) 为 1.20 (1.10, 1.32), 需治疗的患者数 (99% CI) 为 6.67 (4.35, 12.5); 神经功能缺损评分、日常生活活动能力评分比较的 WMD (99% CI) 分别为 -3.82 (-6.45, -1.19)、13.00 (4.26, 21.74)。结论 Meta 分析结果显示, 丹参酮 II A 可改善缺血性卒中急性期神经功能缺损, 提高患者日常生活活动能力, 安全性较高。

关键词 [丹参酮 II A](#); [卒中](#); [缺血性](#); [急性期](#); [随机对照试验](#); [系统评价](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2012\) 11-01510-03](#)

通讯作者:

作者个人主页: [马丽虹](#); [李冬梅](#); [李可建](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1215KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献 \[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“丹参酮 II A; 卒中, 缺血性; 急性期; 随机对照试验; 系统评价” 的相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [马丽虹](#)
- [李冬梅](#)
- [李可建](#)