

[本期目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[\[打印本页\]](#) [\[关闭\]](#)

论文

平均红细胞血红蛋白浓度对溶血性贫血的诊断价值

康云平; 孙宝云

浙江省杭州市第三人民医院检验科,浙江 杭州 310009

摘要:

目的 观察平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)检测对溶血性贫血(HA)的诊断价值。方法 统计HA、巨幼细胞性贫血(MA)、缺铁性贫血(IDA)、小细胞HA(先天遗传小细胞或合并IDA)各30例患者外周血象平均红细胞血红蛋白量(MCH)、MCHC、平均红细胞体积(MCV)数据,以健康人群30名为对照组,比较各实验组与对照组的MCH、MCHC、MCV均值。结果 HA患者外周血象MCHC明显高于MA、IDA及对照组($P < 0.01$);IDA患者外周血象MCHC明显低于对照组($P < 0.01$);MA患者外周血象MCHC与对照组差异无统计学意义($P > 0.05$),MCV明显高于对照组($P < 0.01$);小细胞HA外周血象MCHC与对照组差异无统计学意义($P > 0.05$),MCV明显低于对照组($P < 0.01$)。结论 外周血象MCHC检测可作为HA的诊断指标。

关键词: [平均红细胞血红蛋白浓度](#) [溶血性贫血](#) [诊断](#)

收稿日期 2007-10-11 修回日期 网络版发布日期 2009-02-26

DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2008.6.368

基金项目:

通讯作者: sunbaoyunge@yahoo.com.cn

作者简介:

本刊中的类似文章

文章评论

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text" value="8455"/>

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(323KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(1KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

- ▶ [平均红细胞血红蛋白浓度](#)
- ▶ [溶血性贫血](#)
- ▶ [诊断](#)

本文作者相关文章

PubMed