

药物与临床

双倍剂量雷公藤多苷联合替米沙坦治疗早期糖尿病肾病32例

吴采忠

(浙江省义乌市中医院肾内科,322000)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 [摘要] 目的观察双倍剂量雷公藤多苷联合替米沙坦治疗早期糖尿病肾病(DN)的临床疗效。方法早期DN患者62例,分为治疗组32例,对照组30例。治疗组服用雷公藤多苷40 mg, tid, 联合替米沙坦80 mg, bid。对照组采用替米沙坦80 mg, bid, po。2组疗程均为3个月。观察2组患者治疗前后尿清蛋白排泄率(UAER)、24 h尿蛋白定量、尿 β_2 微球蛋白(β_2 MG)、血清清蛋白(ALB)、血肌酐(SCr)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)等指标变化。结果疗程结束后治疗组UAER、24 h尿蛋白定量、尿 β_2 MG及SCr水平均明显降低,治疗过程中不良反应少。结论双倍剂量雷公藤多苷联合替米沙坦对早期DN有较好的临床疗效。

关键词 [雷公藤多苷](#); [肾病](#); [糖尿病](#); [尿蛋白](#)

分类号 [R972.4](#); [R587.2](#)

DOI: 10.3870/yydb.2010.09.022

对应的英文版文章: [2010-9-1173](#)

通讯作者:

作者个人主页: 吴采忠

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1128KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“雷公藤多苷; 肾病, 糖尿病; 尿蛋白”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [吴采忠](#)