



» 2012, Vol. 28 » Issue (5): 367-370 DOI:

肾脏病与心血管专题

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

尿酸联合脂蛋白a预测动脉粥样硬化高危人群肾动脉狭窄

夏鹏 邱玲 曾勇 陈丽萌 曾学军 李雪梅 李学旺

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-7097.2012.05.004 基金项目: 国家自然科学基金(30971369, 81170674); 人事部回国计划, 2012CB51780X) 作者单位: 100730北京, 中国医学科学院 北京协和医院肾内科(夏鹏、陈丽萌、李雪梅、李学旺), 检验夏鹏和邱玲对本文有同等贡献, 均为第一作者通信作者: 陈丽萌, Email: climeng2000@yahoo.com.cn

Combining uric acid with lipoprotein a predicts the atherosclerotic renal artery stenosis in high-risk patients

XIA Peng, QIU Ling, ZENG Yong, CHEN Li-meng, ZENG Xue-jun, LI Xue-mei, LI Xue-wang.

Department of Nephrology, Chinese Academy of Medical Sciences, Peking Union Medical College Hospital, Beijing 100730, China
the first authors who contributed equally to the article Corresponding author: CHEN Li-meng, Email: climeng2000@yahoo.com.cn

摘要

图/表

参考文献(0)

相关文章 (15)