

用药指南

克林霉素磷酸酯与地塞米松配伍静脉滴注致变态反应3例

李子荣

(武汉市汉口医院急诊外科, 430012)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 [摘要] 目的探讨克林霉素磷酸酯注射液与地塞米松注射液配伍的合理性。方法门诊使用克林霉素磷酸酯注射液的患者50例, 采用3种方法给药: ①克林霉素磷酸酯注射液常规剂量1.2 g加地塞米松注射液10 mg配伍静脉滴注, qd; ②克林霉素磷酸酯注射液1.2 g和地塞米松注射液10 mg分组静脉滴注, qd; ③使用单组克林霉素注射液1.2 g静脉滴注, qd。结果克林霉素磷酸酯注射液和地塞米松注射液配伍应用时有3例发生变态反应。另两种用法未见变态反应。结论克林霉素磷酸酯注射液和地塞米松注射液配伍应用可致变态反应。

关键词

[克林霉素](#) ; [地塞米松](#) ; [变态反应](#) ; [配伍](#)

分类号 [R978](#); [R977.11](#)

DOI: [10.3870/yydb.2010.03.044](#)

对应的英文版文章: [2010-3-387](#)

通讯作者:

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(417KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“](#)

[克林霉素 ; 地塞米松; 变态反应; 配伍](#)

[” 的 相关文章](#)

- ▶ [本文作者相关文章](#)