## 中国实验方剂学杂志

China Journal of Experimental Traditional Medical Formulae

首页

期刊简介

投稿指南

第三届编委会 特约审稿人

广告合作

在线订阅

联系我们

## 淋巴结核丸对炎症、迟发型变态反应的影响

投稿时间: 2011/9/22

点此下载全文

引用本文: 孙英英, 杨刘奇, 汤红琴, 刘湘花, 李宁宁, 董修兵, 李建国. 淋巴结核丸对炎症、迟发型变态反应的影响[ ፲]. 中国实验方

剂学杂志, 2012, 18(3):195~196 摘要点击次数:58

全文下载次数: 32

作者 单位 E-mail

郑州 450008

孙英英 河南中医学院病理实验中心, 郑州 450008 杨刘奇 河南中医学院病理实验中心, 郑州 450008 汤红琴 郑州 450008 河南中医学院病理实验中心, 刘湘花 河南中医学院病理实验中心, 郑州 450008 李宁宁 河南中医学院病理实验中心, 郑州 450008

董修兵 河南中医学院病理实验中心, 郑州 450008 河南中医学院病理实验中心,

1jg5682588@126.com

基金项目:河南省重点科研项目(9404758)

中文摘要:目的:观察淋巴结核丸对炎症和迟发型变态反应的影响。方法:观察淋巴结核丸高、中、低(含生药40,20,10 g · kg<sup>-</sup> 1)剂量ig 1次对二甲苯致小鼠耳廓肿胀的影响;观察淋巴结核丸同样剂量连续ig 7 d对大鼠棉球肉芽肿质量的影响;观察淋巴结核 丸连续ig 5 d, 对绵羊红细胞致敏大鼠迟发型变态反应(DTH)的影响。结果:淋巴结核丸高、中剂量对二甲苯致炎小鼠有明显的抗 炎作用(高、中剂量组对耳廓肿胀的抑制率分别为18.5%, 9.6%),与模型对照组相比差异显著(PCO.01);淋巴结核丸具有明显的抑制 肉芽肿增生的作用, 高、中、低剂量抑制率分别为44. 73%, 26. 53%, 9. 30%, 与模型对照组相比有显著差异(产0. 01): 淋巴结核丸3个 剂量均能明显增强DTH反应, 与模型对照组相比均有非常显著性差异(P<0.01), 具有明显的增加小鼠细胞免疫的作用。结论: 淋巴 结核丸具有明显的抗炎作用,可增强细胞免疫功能。

中文关键词:淋巴结核丸 抗炎

## 查看全文 查看/发表评论 下载PDF阅读器

## 告服务

李建国













人康缘药业
























Furen\_Pharmacy





杏林包罗药业





₩ 北大駐信







中国实验方剂学杂志编辑部版权所有

您是本站第1672469位访问者 今日一共访问228次 // 地址:北京东直门内南小街16号邮编: 100700

电话: 010-84076882 在线咨询 京ICP备09084417号