

临床报道

影响胆囊结石合并胆总管结石手术治疗效果的因素分析

金峰¹|毛志海²

(1.江苏省南通市通州区第八人民医院 普通外科|江苏 南通 226361; 2.上海交通大学附属瑞金医院
腔镜中心|上海 200025)

摘要:

目的: 探讨影响胆囊结石合并胆总管结石手术治疗效果的因素。方法: 收集临床2007年9月—2011年9月期间腹腔镜下手术治疗的162例胆囊结石合并胆总管结石患者临床资料, 并根据有无结石残留(残留组和取尽组)和术后是否复发(复发和未复发)将患者分组, 并回顾性分析一般资料、围术期常规指标、术后并发症等, 并采用Logistic回归模型分析影响结石清除和术后复发的因素。结果: (1) 资料中有34例结石残留, 128例结石取尽; 25例术后复发, 137例未复发; (2) 年龄、总胆红素异常、胆总管直径、结石最大直径、结石数目、胆总管扩张、胆管扩张、胆管炎、胰腺炎、手术类型是导致结石残留和手术复发的影响因素, 此外, 导致手术复发的因素还包括结石残留和术后并发症; (3) 胆总管直径、结石数目、胆总管扩张、胆管扩张、胆管炎和手术类型是影响胆囊结石合并胆总管结石患者取石效果和手术复发的独立危险因素, 此外, 影响手术复发的独立危险因素还包括独立因素、结石残留和术后并发症。结论: 腹腔镜手术治疗胆囊结石合并胆总管结石的手术成功率较高, 同时影响胆囊结石合并胆总管结石手术治疗效果的因素较多, 应根据患者的具体情况制定相应的方案。

关键词: 胆囊结石/外科学; 胆总管结石/外科学; 预后; 因素分析

Abstract:

Keywords:

收稿日期 2012-11-18 修回日期 2013-04-28 网络版发布日期 2013-05-15

DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.2013.05.030

基金项目:

扩展功能

本文信息

Supporting info

[PDF 648KB](#)

[\[HTML全文\]](#)

[参考文献\[PDF\]](#)

[参考文献](#)

服务与反馈

[把本文推荐给朋友](#)

[加入我的书架](#)

[加入引用管理器](#)

[引用本文](#)

[Email Alert](#)

[文章反馈](#)

[浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

[胆囊结石/外科学; 胆总管
结石/外科学; 预后; 因素
分析](#)

本文作者相关文章

[PubMed](#)