

临床报道

医源性胆道损伤诊治：附16例报告

郭成|高源|殷生亮|戴群英|艾合买提

(新疆哈密红星医院 普通外科|新疆 哈密 839000)

摘要:

目的: 探讨医源性胆道损伤发生的原因及诊疗方法。方法: 回顾性分析2008年8月—2011年8月收治的16例医源性胆道损伤患者的临床资料, 对其发生的原因进行分析及总结其诊疗方法。结果: 医源性胆道损伤的原因诸多, 其中最为主要的原因是胆囊三角区解剖不清(43.75%); 医源性胆道损伤的诊断主要由临床症状、腹腔穿刺及影像学检查等所决定, 其中B超诊断率最高, 可达93.75%(15/16); 按损伤部位可将其分成6型, 其中Ⅲ型最为常见(81.25%); 临床治疗优良率为87.5%。结论: 应注意胆囊切除术实施前对医源性胆道损伤的正确认识, 及时对医源性胆道损伤进行诊疗, 能够明显提高患者治疗的优良率; 治疗根据具体的损伤类型, 选择相应的外科手术方式。

关键词: 胆囊切除术/副作用; 胆道损伤 医源性/预防和控制

Abstract:

Keywords:

收稿日期 2012-11-27 修回日期 2013-01-29 网络版发布日期 2013-02-15

DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.2013.02.032

基金项目:

通讯作者: 郭成, 新疆哈密红星医院副主任医师, 主要从事肝胆方面的研究。

作者简介: 郭成|新疆哈密红星医院副主任医师|主要从事肝胆方面的研究。

本刊中的类似文章

Copyright 2008 by 中国普通外科杂志

扩展功能

本文信息

Supporting info

[PDF 567KB](#)

[\[HTML全文\]](#)

[参考文献\[PDF\]](#)

[参考文献](#)

服务与反馈

[把本文推荐给朋友](#)

[加入我的书架](#)

[加入引用管理器](#)

[引用本文](#)

[Email Alert](#)

[文章反馈](#)

[浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

▶ [胆囊切除术/副作用; 胆道损伤](#)

▶ [医源性/预防和控制](#)

本文作者相关文章

[PubMed](#)