



中老年肢体健康的“杀手”——下肢动脉硬化闭塞症

发布时间：2023-03-01 10:09:21

近日，杨先生因为右脚持续疼痛来到南方医科大学第五附属医院介入血管外科就诊，就诊时右足冰凉，脚趾皮肤发生破溃。CTA提示股浅动脉中远段、腘动脉及膝下动脉闭塞。患者接受血管腔内微创手术，医生通过血管成型手术开通多处闭塞血管，恢复右脚血供。右足血供恢复后皮温变暖，疼痛也就逐渐解除了。南五介入血管外科邓保平主任提醒，下肢动脉硬化患者出现下肢疼痛，需要及时到医院就诊，养成良好的生活习惯，戒烟非常重要，控制好血糖、血压、血脂这些危险因素。

下肢动脉硬化闭塞症是一种退行性病变，在老年人里属于比较常见的疾病，表现走路后脚疼痛，休息几分钟后可以缓解，走一段路程后再次规律出现疼痛，严重情况出现足部坏死溃烂，甚至面临截肢风险。一些因素与下肢动脉硬化闭塞症密切相关，如抽烟、糖尿病、高脂血症、高血压等。



左图 1：下肢动脉 CTA 提示右下肢动脉广泛闭塞病变；左图 2 提示股浅动脉以远闭塞；左图 3-4 提示股浅动脉闭塞，腘动脉部分显影，膝下动脉广泛闭塞



手术开通闭塞股浅动脉、腘动脉及膝下动脉。术中造影提示右足血流满意，皮温变暖。

上一条：南医五院承办省级医用AI机器人的研发与应用学术研讨会，国内代表相约广州

下一条：初春暖阳正当时 儿童义诊促成长

