

击复制

局麻下43例肾功能不全患者二期经皮肾镜碎石术治疗临床分析,PDF分享到:

《第三军医大学学报》[ISSN:1000-5404/CN:51-1095/R] 卷: 36 期数: 2014年第12期 页码: 1338-1340 栏目: 短篇论著 出版日期: 2014-06-30

作者: [徐述雄](#); [石华](#); [朱建国](#); [李凯](#); [王元林](#); [杨秀书](#); [胡建新](#); [刘军](#); [孙兆林](#); [夏术阶](#)
贵州省人民医院泌尿外科; 上海交通大学附属上海市第一人民医院泌尿外科

关键词: [局麻](#); [经皮肾镜碎石术](#); [上尿路结石](#); [肾功能不全](#)

分类号: R692.4

文献标志码: A

摘要: 目的 评估局麻在肾功能不全患者二期经皮肾镜碎石术(percutaneous nephrolithotomy, PCNL)中应用的可行性和安全性。 方法 2009年7月至2013年8月,43例经过一期经皮肾造瘘术后肾功能仍未恢复正常的患者纳入本研究,1%利多卡因沿肾造瘘管周局麻,经原肾造瘘管行二期PCNL。患者在术后0(手术结束时)、4、24、48 h用视觉模拟评分法(VAS)评估患者疼痛程度。 结果 患者均能在局麻下很好地耐受二期PCNL,平均手术时间为57(30~120)min,平均使用1%利多卡因25(12~36)mL,术后0、4、24、48 h的VAS评分分别为(2.9±0.8)、(2.6±0.6)、(2.2±0.7)、(1.9±0.7)分,没有患者使用哌替啶等镇痛剂。无麻醉相关性并发症发生。 结论 局麻在肾功能不全患者二期PCNL中应用是可行和安全的。

参考文献/REFERENCES:

徐述雄,石华,朱建国,等.局麻下43例肾功能不全患者二期经皮肾镜碎石术治疗临床分析[J].第三军医大学学报,2014,36(12):1338-1340.

相似文献/REFERENCES:

- [1]赵洪雯,余荣杰,刘宏,等.儿童静脉复合麻醉与局麻下肾活检的对比研究[J].第三军医大学学报,2008,30(05):450.
ZHAO Hong-wen,YU Rong-jie,LIU Hong,et al.Kidney biopsy under traditional local or transient intravenous anesthesia: a comparative study in children[J].J Third Mil Med Univ,2008,30(12):450.
- [2]黄红梅,陈显春.乳腺疾病局麻术后晕厥4例[J].第三军医大学学报,2010,32(19):2074.

更新日期/Last Update: 2014-06-20

导航/NAVIGATE

[本期目录/Table of Contents](#)

[下一篇/Next Article](#)

[上一篇/Previous Article](#)

工具/TOOLS

[引用本文的文章/References](#)

[下载 PDF/Download PDF\(653KB\)](#)

[立即打印本文/Print Now](#)

[查看/发表评论/Comments](#)

[导出](#)

统计/STATISTICS

[摘要浏览/Viewed](#) 70

[全文下载/Downloads](#) 43

[评论/Comments](#)

[RSS](#) [XML](#)