



您现在的位置： [首页](#) > [科室相关文章](#) > [尿道下裂治疗中心](#)

你的孩子究竟是隐匿阴茎还是隐匿性阴茎？

2018-12-04 阅读量：

你的孩子究竟是隐匿阴茎还是隐匿性阴茎？

隐匿阴茎和**隐匿性阴茎**都是多见于肥胖体形的儿童，其特点为阴茎被埋没于包皮及耻骨下皮下脂肪组织内，由于阴茎体不能自由进入到阴茎皮肤及包皮腔内，表现阴茎外观短小。但是两者还是有不同的，首先**隐匿阴茎**是一种先天畸形，发生率很低，造成的原因是由于阴茎肉膜组织异常纤维化和增厚；而**隐匿性阴茎**是正常阴茎不能自然外露，被包裹在耻骨区域皮下脂肪层中。下面具体讲述一下。



隐匿阴茎 (concealed penis) 是阴茎肉膜发育异常所致的先天性畸形，发病率报道为0.67%。由于阴茎部肉膜发育异常，疏松富有弹性的肉膜变成没有弹性的、厚的纤维筋膜。这些发育异常的筋膜和索条限制了阴茎的伸缩，并将阴茎拘束在耻骨联合下方，这样就造成了**隐匿阴茎**。**隐匿阴茎**因尿道弯曲而致尿线不能前射，严重的可引起尿潴留，需要儿童期进行手术矫正。手术中将无弹性的肉膜纤维组织切除，使阴茎伸长，这样能够避免后期影响阴茎发育。



隐匿性阴茎是一种正常阴茎的异常形态表现，并没有阴茎部肉膜发育异常，造成原因往往和肥胖和包茎有关系。小儿肥胖所致的阴阜阴囊基部脂肪堆积，造成阴茎深藏于皮下；包皮口过小，造成龟头不能外露，阴茎蜷缩于耻骨根部。由于**隐匿阴茎**和**隐匿性阴茎**在临床上鉴别有一定困难，很多**隐匿型阴茎**被误诊为**隐匿性阴茎**，而造成过度的手术治疗。



热点文章

出诊安排

预约挂号

在线咨询

报告查询



APP



对隐匿性阴茎手术年龄目前仍然有很大争论。陈文主任的观点——严格控制手术适应症、避免儿童时期进行不必要的矫正手术。儿童期间，隐匿性阴茎的治疗首先应控制饮食，加强锻炼以减轻肥胖；家长可以在孩子洗澡时，将孩子阴茎皮肤向后推拉，使阴茎头部进入包皮腔内。通过对包皮口的持续扩张，最终是能够松解包皮外口、阴茎头正常外露。随年龄增长，绝大部分儿童隐匿性阴茎都会有不同程度的改善和解决。



对于青春期以后，仍然存在的隐匿性阴茎是需要手术治疗的。手术目的是切开、松解狭窄的包皮外口，使阴茎头外露；同时在耻骨位置切断牵拉阴茎的浅部韧带组织，将阴茎根部在耻骨联合位置进行固定。手术中应当注意的是：由于隐匿性阴茎皮肤组织量不多，和普通的包皮环切不同，在手术时切忌盲目去除所谓多余包皮，要切记每寸包皮都是有用的。

上一篇:维护女人的“私密花园”

下一篇:招募：我院今年将开展50例尿道下裂公益会诊手术

出诊
安排

预约
挂号

在线
咨询

报告
查询



APP



招聘信息



院所简介



现任领导



医院布局



医院机构



地理位置



招聘信息


 中国医学科学院整形外科医院
Plastic Surgery Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences



扫描最新优惠

手机随时咨询

疾病实时咨询

 在线咨询客服
马上咨询 随时随答

 网络预约挂号
无需排队 快速预约

 咨询热线
010-88772233

网站首页 | 院所介绍 | 医院文化 | 科室设置 | 专家介绍 | 整形美容 | 科研教学 | 护理天地 | 医院东院 | 联系我们 | 附属公司 |
质控中心 | 友情链接

版权所有©中国医学科学院整形外科医院 北京市石景山区八大处路33号 邮编：100144

京ICP备08007957号 京卫网审[2013]第0944号 京公安网：1104021102070004

51La