



您现在的位置：[首页](#) > [科室相关文章](#) > [微创整形外科中心](#)

内窥镜下微创修复上睑凹陷

2020-07-31 阅读量：

陈文

目前，双眼皮成形术是国内最常进行的美容手术，同时也成为术后并发症最多的美容项目。由于手术方法选择不当、求美者自身条件原因都可能会造成术后效果不佳。八大处整形外科医院作为全国顶级的整形中心，承担大量复杂整形修复工作，陈文医生作院内主要从事眼整形医生之一，修复双眼皮术后问题成为重要工作内容。下面介绍一下他目前主导的一微创技术和理念在眼部整形手术中的应用。



重睑术后发生上睑凹陷的最常原因是术后眶隔内组织粘连、眶隔脂肪过分后缩。对于这样情况，一般修复方案是沿原来双眼皮褶皱线重新切开，松解粘连并将眶隔脂肪重新覆盖在睑板位置，从而解决凹陷。将上睑重新切开虽然能够有效矫正上睑凹陷，但是手术切口大，手术损伤重，术后恢复慢。为了在矫正上睑凹陷的同时避免过度损伤，陈文医生采用上睑微小切口，在内窥镜的协助对粘连组织进行松解和将后缩眶隔脂肪从新释放到正常位置。这样在修复上睑凹陷同时能够避免过度的手术损伤，同时减少了恢复时间，目前成为微创中心在进行双眼皮术后上睑凹陷治疗的首选方案。

[上一篇:腋臭治疗的新方法](#)

[下一篇:别人眼中的焦点（面部黑痣）的手术治疗](#)

热点文章

[别人眼中的焦点（面部黑痣）的手术治疗](#)

[警惕医源性上睑下垂的发生](#)

出诊
安排

预约
挂号

在线
咨询

报告
查询



APP



院所简介



现任领导



医院布局



医院机构



地理位置



招聘信息



扫描最新优惠
手机随时咨询
疾病实时咨询

在线咨询客服
马上咨询 随时随答

网络预约挂号
无需排队 快速预约

咨询热线
010-88772233

网站首页 | 院所介绍 | 医院文化 | 科室设置 | 专家介绍 | 整形美容 | 科研教学 | 护理天地 | 医院东院 | 联系我们 | 附属公司 | 质控中心 | 友情链接

版权所有©中国医学科学院整形外科医院 北京市石景山区八大处路33号 邮编：100144
京ICP备08007957号 京卫网审[2013]第0944号 京公网安备：1104021102070004



出诊
安排

预约
挂号

在线
咨询

报告
查询



APP

