

经验交流

腋部副乳腺整形切除199例体会

张磊,朱伟良,杨澜

常州市第一人民医院乳腺外科

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 副乳腺为乳腺先天发育畸形,男女皆可发病,女性多见,最常见部位为腋下及腋前。副乳腺小,无明显症状,不需治疗。对于副乳腺较大,且又周期性胀痛,或副乳包块较大,影响美观者,建议行手术治疗。本院乳房外科从2000年1月至2006年8月,共收治副乳腺腺病199例,现分析如下。

关键词 [副乳腺](#) [乳腺腺病](#) [切口选择](#)

分类号

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: [张磊](#); [朱伟良](#); [杨澜](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF](#) (1430KB)
- ▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“副乳腺”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [张磊](#)
 - [朱伟良](#)
 - [杨澜](#)