

[1]范丽 高霞 马亚琳.卡前列素氨丁三醇联合低位B-Lynch缝合术治疗难治性前置胎盘性产后出血的临床分析[J/CD].中华妇幼临床医学杂志(电子版),2013,(02):201-204.

FAN Li,GAO Xia,MA Ya lin..Romethamine Combined With Low B Lynch Suture in the Treatment of Refractory Postpartum Hemorrhage Induced by Placenta Previa[J/CD].Chinese Journal of Obstetrics & Gynecology and Pediatrics (Electronic Edition),2013,(02):201-204.

[点击复制](#)

卡前列素氨丁三醇联合低位B-Lynch缝合术治疗难治性前置胎盘性产后出血的临床分析(2013)

《中华妇幼临床医学杂志(电子版)》[ISSN:1673-5250/CN:11-9273/R] 卷: 期数: 2013年02期 页码: 201-204 栏目: 论著 出版日期: 2013-04-15

Title: Romethamine Combined With Low B Lynch Suture in the Treatment of Refractory Postpartum Hemorrhage Induced by Placenta Previa

作者: [范丽](#) [高霞](#) [马亚琳](#)
442000 湖北十堰, 湖北医药学院附属人民医院妇产科

Author(s): [FAN Li](#); [GAO Xia](#); [MA Ya lin](#).
Department of Obstetrics and Gynecology, Renmin Hospital Affiliated to Hubei University of Medicine, Shiyan 442000, Hubei Province, China.

关键词: [前置胎盘](#); [卡前列素氨丁三醇](#); [低位B-Lynch缝合术](#); [难治性产后出血](#)

分类号: -

DOI: -

文献标识码: -

摘要: 目的 探讨卡前列素氨丁三醇联合低位B-Lynch缝合术治疗难治性前置胎盘性产后出血(PPH)的临床疗效。 方法 回顾性分析2005年1月至2011年1月在本院因前置胎盘行剖宫产分娩,经保守治疗无效确诊为难治性PPH 38例为研究对象,其累计出血量达1000 mL。38例患者立即宫体注射卡前列素氨丁三醇250 μg,同时根据孕周采取低位B Lynch缝合术。观察术后24 h阴道流血量、术后子宫复旧及血性恶露持续时间;术后7 d, 14 d及42 d分别行超声检查,了解宫腔、子宫切口及子宫大小情况;术后半年及1年分别电话随访患者月经恢复时间及情况(本研究遵循的程序符合本院人体试验委员会制定的伦理学标准,得到该委员会批准,并与受试者签署临床研究知情同意书)。 结果 本组38例患者产后出血量达(1500~3000) mL,且均成功止血,并成功保留子宫及其生理功能。术后随访6, 12个月显示,子宫复旧好,无一例发生晚期PPH,月经于术后4~11个月均恢复。 结论 卡前列素氨丁三醇联合低位B-Lynch缝合术,治疗难治性前置胎盘性PPH的疗效确切,手术时间短、易于掌握,值得临床推广应用。

参考文献/REFERENCES

备注/Memo: 收稿日期: 2013 01 05 修回日期: 2013 03 12

更新日期/Last Update: 2013-04-15

[导航/NAVIGATE](#)

[本期目录/Table of Contents](#)

[下一篇/Next Article](#)

[上一篇/Previous Article](#)

[工具/TOOLS](#)

[引用本文的文章/References](#)

[下载 PDF/Download PDF\(636KB\)](#)

[立即打印本文/Print Now](#)

[推荐给朋友/Recommend](#)

[统计/STATISTICS](#)

[摘要浏览/Viewed](#)

[全文下载/Downloads](#) 53

[评论/Comments](#) 44

[RSS](#) [XML](#)