

第六部分 前置胎盘 胎盘早剥

一. 是非题

1. 子宫胎盘卒中是前置胎盘的一种临床表现。
2. 妊娠20周以后或分娩期,前置部位的胎盘在胎儿娩出前,部分或全部从子宫壁剥离称胎盘早剥.
3. 在耻骨联合上方未听到胎盘杂音可排除前置胎盘.
4. B型超声检查示胎盘与子宫之间无液性暗区可排除胎盘早剥.

二. 填空题

1. 胎盘早剥的并发症有_____、_____、_____、_____。
2. 前置胎盘分为_____、_____、_____3种类型。
3. 若无临床症状,妊娠_____一般不作前置胎盘的诊断。
4. 胎盘早剥从病理变化分为_____、_____及_____3种类型。
5. 前置胎盘的处理原则为_____。
6. 前置胎盘的并发症有_____、_____、_____、_____。

三. 名词解释

1. 前置胎盘:
2. 子宫胎盘卒中

四. 选择题

1. 下列何种情况易发生DIC:
A、前置胎盘 B、宫外孕 C、胎盘早剥
D、先兆流产 E、羊水过多
2. 胎盘早剥哪项是错误的:
A、胎盘早剥是指在子宫下段的胎盘发生早期剥离而引起症状者
B、胎盘早剥一旦确诊应迅速终止妊娠
C、妊娠晚期出现阴道流血伴腹痛,常伴有重度妊高征
D、胎盘早剥者可有内出血和外出血同时存在
E、子宫胎盘卒中一旦发生需切除子宫

问题3-4

- A、有妊高征病史 B、突然剧烈腹痛 C、阴道出血与休克症状成正比
D、子宫呈板状,胎心音消失 E、仰卧时间过长
3. 与重型胎盘早剥症状不相符的是:
4. 前置胎盘大出血时:

5. 初产妇26岁,因妊娠36周,无痛性阴道少量流血3天来院就诊,检查:LOA,胎心140次/分,无明显宫缩,诊断为低置胎盘入院,恰当处理是:

A. 绝对卧床休息,期待疗法 B. 立即人工破膜 C. 静滴催产素引产 D. 行剖宫产术 E. 以上都不是

6. 关于胎盘早剥下列哪项错误:

A. 妊高症患者易发生 B. 主要临床症状是腹痛和阴道流血

C. 出现早发性胎心减慢 D. 破膜流出的羊水呈血性羊水

E. 轻型以显性出血较多,重型则以隐性出血较多

7. 前置胎盘的典型临床症状是下列哪项:

A. 胎位异常 B. 妊娠晚期无痛性阴道流血 C. 腹痛

D. B超显示覆盖子宫内口 E. 胎心/胎方位不清

8. 疑前置胎盘,下列哪项检查方法不当:

A. 窥器检查 B. 出血时阴道穹隆扪诊 B. B超定位 D. 肛门指诊

E. 多普勒胎心仪

五. 问答题

1. 前置胎盘与胎盘早剥的鉴别诊断。

2. 前置胎盘对母儿的影响有哪些。

3. 前置胎盘作阴道检查时注意事项。

4. 胎盘早剥的常见并发症及处理。

六. 病案分析

1. 林X,女,26岁,孕3产0,因停经8+月,阴道流血3天于98年6月18日入院。LMP 97 11 5,EDC 98 8 12,停经1+月有早孕反应,停经4+月感胎动,停经6个月始行产前检查,共4次,均为横位。6月15日无诱因出现阴道流血,无腹痛,阴道流血量同月经量,今晨起阴道流血增多,故收入院。既往月经规则,13 3-4/30,23岁结婚,孕3产0人流2,末次人流为97年3月,术后阴道流血1+月,经消炎治疗流血停止。

查:一般情况好, BP 110/70mmHg, P 90次/分, R 20次/分, T 36.8℃, 心肺(-)。产科情况:腹部隆,宫高32cm,腹围84cm,臀先露,浮,LSA,胎心音132次/分,无宫缩,子宫无压痛,阴道少量流血, Hb 96g/L, WBC 15×10⁹/L, N 78%, L 22%, pt 150×10⁹/L。

请提出:(1)诊断及诊断依据

(2)进一步确诊方法

(3)处理意见