

第七部分 孕期监护

一. 是非题

1. 胎心率基线是指在无胎动、无宫缩或宫缩间歇期记录的胎心率。
2. 胎动是判断胎儿宫内安危的最简单方法。
3. 早期减速是胎儿宫内缺氧的表现。
4. B超见三级胎盘,提示胎盘功能减退。

二. 填空题

1. NST又名_____试验,临床上用来了解_____。
2. 胎儿生物物理监测包括_____、_____、_____、_____。
3. 胎心率监测中出现早期减速提示有_____,变异减速提示是_____,晚期减速提示有_____。

三. 名词解释

1. NST:
2. BFHR:
3. PFHR:
4. 基线摆动:
5. NST:
6. OCT:
7. VD:
8. LD:

四. 选择题

1. 胎盘功能检查不包括:
A. 胎动记数 B. E3测定 C. E/C比值测定 D. HPL测定 E. L/S测定
2. 造成胎儿宫内生长发育迟缓最常见的原因是:
A. 臀位 B. 胎盘早剥 C. 高龄初产 D. 妊高症 E. 经产妇
3. 估计胎儿宫内安危最简便的方法是:
A. 胎心音计数 B. 羊膜镜检查 C. 胎儿监护仪检查 D. 胎动计数
E. 胎儿头皮血PH值测定
4. 关于胎儿宫内窘迫,下列哪项描述正确:
A. 宫缩时胎心音108次/分 B. 臀位临产后羊水有胎粪
C. 多次出现早期减速 D. 胎儿头皮血PH<7.20

E. 20分钟3次胎动, 每次胎动加速15-20bpm

5. 胎儿-胎盘功能单位是指:

A. 孕妇血或尿雌三醇(E3)测定 B. OCT C. NST D. 血清HPL 的测定

E. 血清PRL的测定

6. 了解胎儿成熟度, 下列哪种方法合适:

A. L/S比值>2 B. 肌酐值 $\geq 2\text{mg}$ C. 羊水中脂肪细胞出现率15%

D. 羊水胆红素值 $\Delta\text{OD}_{450} < 0.02$ E. 羊水淀粉酶值 $\geq 450\text{u/L}$

五. 问答题

1. 判断和检测胎盘功能的方法有那些?

2. 胎儿成熟度检查有哪些?

3. PFHR三种减速的特点及各自发生原因。

4. 胎儿生物物理评分的指标及临床意义。

5. 高危妊娠的处理主要有哪些。

[返回](#)