

一. 是非题

1. 宫缩乏力的出血特点是胎盘剥离延缓、剥离时因宫缩乏力使子宫出血不止，用宫缩剂止血效果好；软产道裂伤出血发生在胎儿娩出后，间歇性出血，用宫缩剂有效。
2. 有子宫手术疤痕者易发生子宫破裂，临产后住院分娩，可严密观察下经阴道分娩。

二. 填空题

1. 产后出血的病因可分为_____、_____、_____及_____。
2. 产后正常子宫收缩所具有的特点是_____、_____、_____。
3. 产褥感染来源有_____及_____，以前者的感染更重要
4. 产后出血的原因有_____、_____、_____、_____。
5. 根据子宫破裂的原因，可分为_____和_____两类。

三. 名词解释

1. 产后出血
2. 产褥病率:
3. 产褥感染:
4. 胎盘植入

四. 选择题

1. 下列哪种情况不是先兆子宫破裂的症状体征:
 - A. 子宫下段有压痛
 - B. 两侧圆韧带极度紧张
 - C. 血尿
 - D. 产妇阵痛难忍
 - E. 阴道流血
2. 关于子宫破裂, 下列哪项错误:
 - A. 多发生于经产妇, 特别多发生于多产妇
 - B. 有时发生于妊娠期
 - C. 有时破裂前无剧烈腹痛
 - D. 胎儿进入腹腔后宫缩继续存在
3. 经产妇顺产20分钟胎盘完整娩出, 产后断续少量阴道流血3小时后感头昏, 心中不适, 打哈欠, 检查: 面色苍白, 血压74/50mmHg, P120次/分, 细, 宫底脐上4横指, 有压痛, 阴道少量淡红色血水, 可能诊断是:
 - A. 产后循环衰竭
 - B. 产道裂伤所致休克
 - C. 隐性产后出血并休克
 - D. 子宫破裂
 - E. 凝血机制异常所致休克
4. 为预防产后出血, 下列哪项正确:
 - A. 双胎妊娠于第一个娩出后5分钟, 立即人工破膜设法娩出第二个
 - B. 对有产后出血史者, 宫口开全后, 娩出胎儿前, 穴位注射催产素1单位
 - C. 凡有产后出血史者, 于胎儿娩出后立即人工破膜, 剥离胎盘
 - D. 胎头娩出后, 宜在宫缩间歇期协助胎儿前、后肩及躯干娩出

5. 某产妇胎盘娩出后持续阴道流血多时, 色暗红, 有凝血块, 可能出血原因是:

A. 软产道损伤 B. DIC C. 子宫胎盘卒中 D. 子宫收缩乏力 E. 胎盘粘连

五. 问答题

1. 试述子宫破裂的临床表现及处理。
2. 产褥感染的病理及临床表现。
3. 产后出血的治疗原则及主要处理措施。
4. 请写出4种引起产妇死亡的常见产科并发症。

六. 病案分析

1. 王X, 22岁, 孕1产1, 孕9+月产后大流血8+小时, 于今7AM急诊入院, 孕6+ 月时发生一次无痛性阴道流血, 量较多, 未治疗自行好转止血. 昨7AM临产, 11AM在当地医院自然分娩一3500g男婴, 15' 后胎盘自然娩出, 检查胎盘有部分缺损, 继而为解小便可大出血, 并昏倒 一次, 约2分钟后自行苏醒, 经输液及注射催产素于下午3时50分送来急诊. 查:BP90/60 mmHg, P120次/分, R20次分, 宫缩好, 流血不多, 宫底脐上2指, 输液输血治疗, 7PM转入病房。查血象: Hb40g/L, WBC 14×10^9 , NO. 87, LO. 13

请回答下列问题:

- (1) 诊断及最可能的出血原因是什么?
- (2) 如何进一步诊断及处理?

返回