

第十二部分 子宫肌瘤 子宫内膜癌

一. 是非题

1. 子宫肌壁间肌瘤的临床表现是经量增多, 经期缩短。
2. 子宫内膜癌转移途径主要为血行转移。
3. 子宫肌瘤红色变性确诊后, 首先保守治疗, 不作手术。

二. 填空题

1. 与雌激素有关的妇科肿瘤有_____、_____、_____。
2. 根据子宫肌瘤与子宫肌壁的关系可分为_____、_____及_____肌瘤
3. 常见的肌瘤变性有_____、_____、_____及_____。
4. 子宫内膜癌病变多见于_____, 以_____附近更多, 其次为_____, 依病变形态和范围分为_____和_____两种, 依显微镜检分为_____, _____、_____、_____及_____四种。
5. 子宫内膜癌转移途径主要为_____, _____, 晚期有_____。
6. 确诊子宫内膜癌最常用的方法是_____。
7. 宫体癌综合征是指_____。

三. 名词解释

1. 子宫肌瘤红色变性;
2. EIN;
3. 宫体癌综合征

四. 选择题

1. 关于子宫肌瘤的变性, 下列哪项错误:
A、红色变性 B、囊性变 C、玻璃变性 D、肉瘤变 E、葡萄样变
2. 子宫肌瘤迅速增大, 应考虑:
A、感染 B、囊性变 C、红色变性 D、脂肪样变 E、肉瘤变
3. 子宫肌瘤的手术指征哪项错误:
A、粘膜下肌瘤 B、子宫增大如孕3月大小 C、肌瘤影响生育
D、症状明显导致贫血 E、围绝经期肌瘤小, 无症状
4. 下列哪种性激素对子宫内膜癌治疗有效:
A. 雌激素 B. 孕激素 C. 雄激素 D. 肾上腺皮质激素 E. 甲状腺激素
5. 有关内膜癌, 下述哪项错误:

A. 绝大多数为腺癌 B. 其发生与子宫内膜腺瘤型增生关系不大

C. 病灶位于子宫体上段或宫底部时转移至腹主动脉旁淋巴结

D. 晚期子宫内膜癌及复发癌可用高效孕激素治疗

E. 子宫内膜癌发展较缓慢

6. 子宫内膜癌Ia期,最好的治疗方法是:

A. 放射治疗,盆腔外照射 B. 全子宫切除术,保留卵巢

C. 全子宫切除及双输卵管卵巢切除术 D. 广泛性子宫切除术

E. 广泛性子宫切除及盆腔淋巴清扫

五. 问答题

1. 子宫肌瘤的手术指征有哪些?

2. 子宫肌瘤的主要临床症状?它需与哪些病相鉴别?

3. 子宫内膜癌的临床分期及治疗原则。

4. 子宫内膜癌临床表现及鉴别诊断。

5. 子宫肌瘤引起阴道流血的原因有哪些?

六. 病案分析

1. 王X, 因经量增多1年, 于20002年9月30日入院, 患者既往月经133-5/28-30天, 月经量中等, 每次用卫生巾1+包, 无痛经, 近1年出现月经量明显增多, 为平时月经的2-3倍, 有血块, 伴头昏乏力, 未诊治。平时白带正常。LMP 2002.9.10。25岁结婚, 婚后5年足月剖宫产一次, 孕3产1, 末次妊娠98年, 上环避孕。体查: T 37℃, P 84次/分, R 20次/分, BP 15/12kpa。发育正常, 营养中等, 轻度贫血貌, 神清, 检查合作, 心肺未发现异常, 腹软, 下腹正中可见一手术疤痕, 脾未扪及, 下腹部正中可扪及一肿块, 肾区无叩痛。

妇科检查: 外阴阴道正常, 宫颈轻糜, 大小质正常, 宫体前位, 增大如孕3+月妊娠大小, 表面凹凸不平, 质硬, 结节状, 活动可, 无压痛, 双附件正常。门诊资料: Hb 87g/l, wbc $6.8 \times 10^9/L$, N 0.65, L 0.30, E 0.05, pt $120 \times 10^9/L$ 。

请根据病史及体征, 写出诊断及鉴别诊断, 并写出诊断依据, 还需作哪些检查及治疗原则。

2. 周X, 女, 45岁, 孕3产2, 因月经量增多2年于99年5月9日入院。患者96年5月开始月经量增多, 由每次用纸2包增加到5包, 有血块, 无痛经, 经期延长至7-8天, 周期规则, 经期伴头昏眼花。既往无特殊, 平时月经13 3/ 28-30。

检查: 一般情况可, 心肺无异常, 妇查: 外阴、阴道(-), 宫颈肥大, 中糜, 宫体后位, 约孕3+月大小, 表面不平, 质硬, 活动, 无压痛, 双附件(-)。

化验: Hb 85g/L, wbc $8 \times 10^9/L$, N 70%, L 24%, E 6%, pt $200 \times 10^9/L$, BT 30', CT 2'。

请提出: (1) 初步诊断, 诊断依据

(2) 进一步检查

(3) 如何治疗处理