

临床经验交流

136例中、重度卵巢过度刺激综合征临床病例分析

朱芝玲[△], 归绥琪, 娄水根

复旦大学附属妇产科医院妇科, 上海 200011

收稿日期 2009-6-23 修回日期

网络版发布日期 接受日期

摘要

目的 探讨辅助生育技术中的卵巢过度刺激综合征(OHSS)的诱因及临床监测与治疗方法。

方法 对我院136例患者中、重度卵巢过度刺激综合征临床资料进行回顾性分析。结果 (1) OHSS 发生的高危因素: 双侧卵巢被激发过多卵泡、应用人绒毛膜促性腺激素(hCG)以及妊娠。(2) OHSS 大多发生在应用促排卵药物后3~10 d。(3) 妊娠患者OHSS 病程长、症状重、白蛋白应用量大。(4) 扩容防血液浓缩、静脉滴注白蛋白为治疗OHSS 的有效措施; 重症患者穿刺引流胸腹水可缓解症状。结论 OHSS 为促超排卵引起的严重并发症, 应予正确防治。

关键词

[卵巢过度刺激综合征; 控制性超排卵; 体外受精-胚胎移植](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(877KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含 “
卵巢过度刺激综合征; 控制性超排
卵; 体外受精-胚胎移植
” 的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [朱芝玲, 归绥琪, 娄水根](#)