

[1]祝红,王攀,黄良国,等.帕罗西汀与克龄蒙联合治疗围绝经期抑郁症5-羟色胺、雌二醇变化及疗效观察[J].第三军医大学学报,2014,36(14):1531-1532.

点击

复制

帕罗西汀与克龄蒙联合治疗围绝经期抑郁症5-羟色胺及疗效观察



分享到:

《第三军医大学学报》[ISSN:1000-5404/CN:51-1095/R] 卷: 36 期数: 2014年第14期 页码: 1531-1532 栏目: 短篇论著 出版日期: 2014-07-30

作者: 祝红; 王攀; 黄良国; 杨丽; 于娜
遵义医学院附属医院: 神经内科, 核医学科

关键词: 围绝经期抑郁症; 5-羟色胺; 雌激素; 帕罗西汀; 克龄蒙

分类号: R711.51; R749.4; R971.43

文献标志码: A

摘要: 目的 观察帕罗西汀与克龄蒙联合治疗围绝经期抑郁症血清雌二醇(E_2)及5-羟色胺(5-HT)变化及疗效。方法 将我院神经内科门诊 2010年5月至2013年5月收治的围绝经期抑郁症患者60例随机分成帕罗西汀组(甲组)及帕罗西汀+克龄蒙组(乙组),每组30例。甲组单用盐酸帕罗西汀片20 mg/d 口服,乙组予盐酸帕罗西汀片20 mg/d 口服+克龄蒙1片/d口服,21 d/月,总疗程12周。分别于治疗前、治疗后检测血清 E_2 及5-HT水平,并进行汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评分,同时观察疗效。检测30例正常生育期妇女之血清 E_2 、5-HT作为正常对照标本。结果 甲、乙两组治疗后4、8、12周HAMD、HAMA评分均较治疗前显著减少,其中乙组评分减少率显著高于甲组($P<0.05$)。血清 E_2 值和5-HT值均高于治疗前,其中乙组显著高于甲组($P<0.05$)。总有效率乙组显著高于甲组($P<0.05$)。两组均未发现明显不良反应。结论 帕罗西汀与克龄蒙联合治疗围绝经期抑郁症显著提高血清 E_2 、5-HT水平,疗效好,且较安全,可提高患者生活质量。

参考文献/References:

祝红,王攀,黄良国,等.帕罗西汀与克龄蒙联合治疗围绝经期抑郁症5-羟色胺、雌二醇变化及疗效观察[J].第三军医大学学报,2014,36(14):1531-1532.

更新日期/Last Update: 2014-07-18

导航/NAVIGATE

[本期目录/Table of Contents](#)

[下一篇/Next Article](#)

[上一篇/Previous Article](#)

工具/TOOLS

[引用本文的文章/References](#)

[下载 PDF/Download PDF\(396KB\)](#)

[立即打印本文/Print Now](#)

[查看/发表评论/Comments](#)

[导出](#)

统计/STATISTICS

摘要浏览/Viewed

全文下载/Downloads 82

评论/Comments 49



更新日期/Last Update: 2014-07-18