

[1]王功僚 邓仕华 李慧娴 黄积德.婴儿期特发性血小板减少性紫癜的临床特点分析[J/CD].中华妇幼临床医学杂志(电子版),2013,(02):193-196.

WANG Gong liao,DENG Shi hua,LI Hui xian,et al.Clinical Analysis of Infantile Idiopathic Thrombocytopenic Purpura[J/CD].Chinese Journal of Obstetrics & Gynecology and Pediatrics (Electronic Edition),2013,(02):193-196.

[点击复制](#)

婴儿期特发性血小板减少性紫癜的临床特点分析(PDF)

《中华妇幼临床医学杂志(电子版)》[ISSN:1673-5250/CN:11-9273/R] 卷: 期数: 2013年02期 页码: 193-196 栏目: 论著 出版日期: 2013-04-15

Title: Clinical Analysis of Infantile Idiopathic Thrombocytopenic Purpura

作者: 王功僚 邓仕华 李慧娴 黄积德

533000 广西百色, 广西百色市妇幼保健院儿科

Author(s): WANG Gong liao; DENG Shi hua; LI Hui xian; HUANG Ji de.

Department of Pediatrics, Guangxi Baise Maternal and Child Health Care Hospital, Baise 533000, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China.

关键词: 婴儿; 血小板减少性紫癜; 特异性; 临床特点; 治疗

分类号: -

DOI: -

文献标识码: -

摘要: 目的 探讨婴儿期特发性血小板减少性紫癜(ITP)的临床特点。方法 收集2006年1月至2011年12月在本院儿科住院的婴幼儿ITP患儿130例为研究对象,均符合ITP的诊断标准。按照年龄段,将其分为婴儿组(n=67,≤12个月龄)和幼儿组(n=63,1~3岁)。两组患儿的性别、年龄等比较,差异无统计学意义(P>0.05)(本研究遵循的程序符合本院人体试验委员会制定的伦理学标准,得到该委员会批准,分组征得受试对象监护人的知情同意,并与之签署临床研究知情同意书)。采用回顾性分析法对两组ITP患儿的性别构成、发病诱因、入院时血小板(PLT)计数、临床表现、疗效及转归等进行统计学分析。结果 婴儿组和幼儿组的男、女患儿比例比较,差异无统计学意义(U=0.6499, P>0.05)。婴儿组于发病前4周内存在前驱感染者占40.29%(27/67),幼儿组占60.32%(38/63),两组比较,差异有统计学意义(U=2.2827, P<0.05);婴儿组于发病前4周内存在疫苗接种史者为23.88%(16/67),幼儿组为0(0/63),两组比较,差异有统计学意义(U=4.2909, P<0.01)。婴儿组患儿入院时中位PLT计数均低于幼儿组,两者比较(8×10⁹/L vs. 13×10⁹/L),差异有统计学意义(t=2.864, P<0.01)。婴儿组ITP多导致皮肤出血,出血程度较轻;而幼儿组则多导致皮肤黏膜出血,或皮肤与黏膜混合出血,出血程度较重,但其他出血部位婴儿组多于幼儿组(U=2.3238, P<0.05)。婴儿组疗效(完全缓解率+有效率)为100.00%,无一例进展至慢性ITP;幼儿组疗效(完全缓解率+有效率)为92.06%(58/63),11例(17.46%)进展至慢性ITP。结论 婴儿期ITP的发病诱因为婴儿期疫苗接种史,临床常规ITP治疗对婴儿期ITP疗效较好,起效快,不易进展至慢性ITP。

[导航/NAVIGATE](#)

[本期目录/Table of Contents](#)

[下一篇/Next Article](#)

[上一篇/Previous Article](#)

[工具/TOOLS](#)

[引用本文的文章/References](#)

[下载 PDF/Download PDF\(576KB\)](#)

[立即打印本文/Print Now](#)

[推荐给朋友/Recommend](#)

[统计/STATISTICS](#)

[摘要浏览/Viewed](#)

[全文下载/Downloads](#) 67

[评论/Comments](#) 44



备注/Memo: 收稿日期: 2012 09 18 修回日期: 2013 01 09

更新日期/Last Update: 2013-04-15