

儿科用药专栏

咪达唑仑治疗小儿惊厥持续状态15例

邢程

长江大学附属第一医院儿科,湖北荆州434000

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 目的 探讨咪达唑仑治疗小儿惊厥持续状态的疗效。方法 将32例惊厥持续状态患儿随机分为两组,治疗组15例给予静脉注射负荷量咪达唑仑0.1~0.2 mg/kg-1镇静诱导,然后用微量注射泵持续泵入用0.9%氯化钠溶液配制成的0.1%咪达唑仑,根据患儿惊厥发作情况调整剂量,达到满意的镇静水平,发作停止后保持该泵入速度。对照组18例给予地西洋0.3~0.5 mg/kg-1静脉注射,如无效,15 min后重复一次。结果 治疗组显效8例,有效5例,无效2例;对照组显效6例,有效5例,无效6例,治疗组有效率明显高于对照组 (P<0.01)。结论 咪达唑仑治疗小儿惊厥持续状态有效。

**关键词** [咪达唑仑](#) [地西洋](#) [惊厥,小儿](#)

分类号

**DOI:**

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2008\) 05-0537-02](#)

通讯作者:

作者个人主页: 邢程

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(1155KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)

▶ [参考文献 \[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“咪达唑仑”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [邢程](#)