



您当前的位置是: 首页 >> 资料库 >> 2006期 >> 第4期

两种方法用于股静脉采血后止血效果比较

侯海连 梁小琼 莫彩玲

(肇庆市第二人民医院儿科 广东肇庆 肇庆市第二人民医院儿科 广东肇庆)



资料库



浏览次数 242349

2007年		
第1期	第2期	第3期
第4期		
2006年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2005年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2004年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2003年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

[摘要] 目的探讨新生儿股静脉采血拔针后有效的止血方法。方法82例股静脉采血后新生儿随机分为两组, 对照组拔针后采用单纯指压法按压止血; 观察组拔针后采用喂奶加指压法按压止血。观察止血效果和穿刺部位皮肤情况。结果观察组按压2 min针眼已止血, 无出现皮肤淤斑; 对照组12例未止血, 6例出现皮肤淤斑, 两组均无出现局部血肿, 两组止血效果有显著性差异($\chi^2=14.06, P<0.05$)。结论喂奶加指压法按压止血, 新生儿表现安静, 有利于针眼止血, 防止出现皮肤淤斑和局部血肿。

[关键词] 新生儿 股静脉 止血 指压 喂奶

[中国分类号] [文献标识码] [文章编号]

()

[Key words]

【关闭窗口】

2002年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2001年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2000年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

COPYRIGHT © 护理学报 地址：广州市广州大道北1838号 技术支持：网天科技

您是第 **303651** 位访客