中国循证儿科杂志 2006 (1): 40-45 ISSN: 0379-4172 CN: 31-1969/R

论著

稳心颗粒对小儿期前收缩疗效的随机对照研究

杜忠东,林瑶,王阳,等

首都医科大学附属北京儿童医院心脏中心 首都医科大学附属北京儿童医院心脏中心 首都医科大学附属北京儿童医院心脏中心 首都医科大学附属北京儿童医院心脏中心 首都医科大学附属北京儿童医院心脏中心 首都医科大学附属北京儿童医院内科

收稿日期 2004-1-3 修回日期 网络版发布日期 2006-5-4 接受日期

摘要 [摘要] 目的 探讨中药稳心颗粒对小儿期前收缩的疗效及安全性。方法 用前瞻性单盲随机对照的研究设计，将发病一个月内的期前收缩住院患儿随机分成治疗和对照两组。对照组常规保心肌治疗3周，治疗组在常规治疗基础上加服稳心颗粒3周。治疗前、后用5分钟心电图和Holter评估期前收缩频率。疗效分显效、有效和无效三种，显效为期前收缩消失或较治疗前减少75%或以上；有效为减少50～74%；无效为无减少或较原来增加。结果 103例患儿(男59，女44例，年龄1~14岁，平均7.8±3.8岁)入选为研究对象，房性期前收缩21例(20.4%)，室性期前收缩78例(75.7%)，交界性期前收缩2例(1.9%)，同时有房性和室性期前收缩2例(1.9%)。55例分到治疗组，48对照组，治疗后症状改善率两组间无差异，治疗组体征改善率好于对照组(P=0.05)；5分钟心电图评价治疗组总有效率达70.9%，显著高于对照组(41.7%，P=0.029)；Holter评价治疗组总有效率65.5%，显著高于对照组(37.5%,P=0.045)；房性期前收缩疗效好于室性期前收缩。治疗组3例(2.9%)出现轻度恶心、呕吐或便秘；血、尿、肝肾功能等无改变。结论 稳心颗粒对新发现的小儿期前收缩有治疗作用，房性期前收缩疗效更好。除2.9%患儿出现轻度的消化道症状外，该药对患儿无其它副作用，适于儿科应用。

关键词 期前收缩 室性期前收缩 房性期前收缩 小儿 中药 随机对照研究

分类号

DOI:

扩展功能

本文信息

Supporting info

PDF(462KB)

[HTML全文](0KB)

参考文献[PDF]

参考文献

服务与反馈

把本文推荐给朋友

加入我的书架

加入引用管理器

引用本文

Email Alert

文章反馈

浏览反馈信息

相关信息

本刊中 包含“期前收缩”的 相关文章

本文作者相关文章

· 杜忠东

· 林瑶

· 王阳

· 等

通讯作者:

杜忠东 duzd@imicams.ac.cn

作者个人主页: 杜忠东;林瑶;王阳;等