

## 药物与临床

### 吸收性止血绫在鼻内窥镜手术后的应用

陈观明<sup>1</sup>, 崔永华<sup>1</sup>, 吴涛<sup>2</sup>, 严娟<sup>3</sup>

1. 华中科技大学同济医学院附属同济医院耳鼻喉科, 武汉430030; 2. 湖北省沙洋农场总医院五官科, 448200; 3. 湖北省沙洋县人民医院五官科, 448200

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 目的: 探讨鼻窦内窥镜手术(ESS)后术腔填塞物的疗效。方法: 对行ESS手术后慢性鼻窦炎、鼻息肉II型II期患者218例, 随机分为A、B、C 3组; 术后A组118例用吸收性止血绫(S100), B组120例用止血纱布, C组80例用凡士林纱条, 进行鼻窦术腔填塞, 按照海口(1997年)ESS疗效标准进行评估。结果: A组疗效及换药次数均优于其他两组。A组术后1个月只需要用0.9%氯化钠溶液冲洗术腔, 1个月后行鼻窦内窥镜检查术腔90.0%上皮化生。偶可见少许残留止血绫。结论: 术后应用吸收性止血绫填塞有利窦腔上皮化生, 明显减少换药次数及范围, 减少患者的痛苦、促进早日康复均有极其重要意义。

**关键词** [吸收性止血绫](#) [鼻窦炎](#) [内窥镜鼻窦手术](#)

分类号

**DOI:**

对应的英文版文章: [1004-0781\(2004\)07-0478-02](#)

通讯作者:

## 扩展功能

### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1080KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

### 服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

### 相关信息

- ▶ [本刊中 包含“吸收性止血绫”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [陈观明](#)
- [崔永华](#)
- [吴涛](#)