

## 药物与临床

地红霉素联合尼美舒利治疗急性化脓性扁桃体炎42例

金晶1, 2, 袁玉林1, 叶林峰2, 李俊2, 周绪红2

(1.武汉大学基础医学院, 430071; 2.武汉大学中南医院耳鼻喉科, 430071)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** [摘要] 目的探讨地红霉素联合尼美舒利治疗急性化脓性扁桃体炎的疗效及安全性。方法急性化脓性扁桃体炎患者80例分成两组。治疗组42例, 口服地红霉素肠溶片500 mg, qd, 尼美舒利分散片100 mg, bid; 对照组38例, 口服罗红霉素片150 mg, bid, 对乙酰氨基酚片500 mg, tid。连续服药3~5 d。观察两组患者体温开始下降时间、体温恢复正常时间、咽喉肿痛消失时间, 并根据症状改善情况比较两组的疗效, 记录患者不良反应, 肝、肾功能检查异常情况。结果治疗组和对照组体温开始下降时间分别为(1.0±0.5)和(1.5±0.5) d, 体温恢复正常时间分别为(1.5±0.5)和(2.5±0.5) d, 咽喉肿痛消失时间分别为(2.0±0.5)和(3.5±0.5) d (P<0.05或P<0.01); 治疗组和对照组痊愈率分别为76.2%和63.2%, 总有效率分别为95.2%和81.6% (P<0.05)。治疗组3例出现一过性水肿、上腹部不适等不良反应, 对照组2例出现上腹部不适和血转氨酶异常不良反应。结论地红霉素联合尼美舒利治疗急性化脓性扁桃体炎比罗红霉素片联合对乙酰氨基酚疗效更好, 不良反应较少, 且均为一过性, 患者耐受良好。

**关键词** [地红霉素](#); [尼美舒利](#); [扁桃体炎](#), [化脓性](#), [急性](#)

分类号 [R978.15](#); [R766.18](#)

DOI: [10.3870/yydb.2010.12.022](#)

对应的英文版文章: [2010-12-1595](#)

通讯作者:

## 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#)(1119KB)

▶ [\[HTML全文\]](#)(OKB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ 本刊中 包含“[地红霉素](#); [尼美舒利](#); [扁桃体炎](#), [化脓性](#), [急性](#)”的 [相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [金晶](#)

•

• [袁玉林](#)

• [叶林峰](#)

• [李俊](#)