

药物与临床

桉柠蒎肠溶胶囊在慢性鼻窦炎鼻息肉鼻内镜围手术期应用

李伟利,叶成刚,李潜芝

(湖北江汉油田总医院耳鼻咽喉头颈外科,湖北潜江433124)

收稿日期 2011-4-28 修回日期 2011-8-4 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 观察桉柠蒎肠溶胶囊在慢性鼻窦炎、鼻息肉内镜手术围手术期应用对术后术腔恢复的影响. 方法将61例接受功能性鼻内镜手术治疗的慢性鼻窦炎、鼻息肉患者随机分为治疗组31例和对照组30例. 两组进行常规的围手术期一般处理:术前均给予抗菌药物静脉滴注,qd,连续3~4 d;术后均给予抗菌药物静脉滴注,qd,连续5~7 d;后改为口服抗菌药物约1周. 术后第3天清理术腔填塞藻酸钙敷料,第4天开始给予0.9%氯化钠溶液鼻腔冲洗,每天1或2次,连续2个月. 并用盐酸布地奈德喷鼻,每次每侧2喷,bid;1周后,每次1喷,qd,连续3个月. 治疗组口服桉柠蒎肠溶胶囊,术前每次300 mg,tid,连续3~4 d;术后第2天开始服用,每次300 mg,tid,连续3~4周,后改为每次300 mg,bid,连续2~4周. 两组患者于术后1,2,3, 4,6,8,12,16,22周行内镜检查,记录术腔情况. 结果 治疗组术后术腔内镜黏膜形态评分,总分≤5分27例,总分>5分4例,对照组分别为17和13例. 治疗组术后内镜黏膜形态评分情况优于对照组,差异有统计学意义($\chi^2=9.02, P<0.01$). 结论 内镜鼻窦手术围手术期使用桉柠蒎肠溶胶囊有助于加快术后黏膜恢复,提高手术疗效;桉柠蒎肠溶胶囊为理想的内镜鼻窦手术围手术期辅助用药.

关键词 [桉柠蒎肠溶胶囊](#) [鼻窦炎](#) [鼻息肉](#) [内镜术](#)

分类号 [R286](#) [R765.4](#)

DOI: 10.3870/yydb.2012.01.019

对应的英文版文章: [1004-0781\(2012\)01-0049-02](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1087KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“桉柠蒎肠溶胶囊”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [李伟利](#)
 - [叶成刚](#)
 - [李潜芝](#)