

## ◎ 会员登录

用户名:   
密码:   
验证码:

2 J V F 8

看不清?换一张

[登录](#) [注册](#) [忘记密码](#)

## ◎ 快速通道

[作者投稿](#)

[作者查稿](#)

[编辑审稿](#)

[专家审稿](#)

## 期刊摘要

> 您当前的位置:网站首页→期刊摘要

中老年脑梗死患者执行功能的康复效果研究 [点击下载全文](#)

陈长香, 邢琰, 李建民

唐山, 河北联合大学护理与康复学院(陈长香); 石家庄市第一医院护理部(邢琰); 河北联合大学神经病学研究所(李建民)

基金项目:河北省科技厅科技支撑项目(2009276103D-3) 河北省社会科学基金项目(HB11SH041)

DOI:2012年06期

摘要点击次数: 35

全文下载次数: 29

摘要:

目的探讨执行功能干预训练对中老年脑梗死患者执行功能的影响, 寻求提高患者执行功能的最佳方法。方法选取80例经我院神经内科确诊的中老年脑梗死患者, 年龄 $\geq 50$ 岁。按随机数字表法分为治疗组和对照组, 排除治疗不满1个月和干预训练不配合以及其他主动或被退出研究的患者, 共有73例患者完成一系列评测和/或干预训练, 其中治疗组36例, 对照组37例。对照组采取常规药物治疗; 治疗组采取常规药物治疗和一系列执行功能干预措施进行综合治疗。采用执行功能缺陷综合征的行为学评价检测(BADS)法分别对2组患者在治疗前、治疗3个月和治疗6个月时分别进行执行功能评测, 并进行统计学分析。结果治疗组: 治疗3个月与治疗前比较, 除程序性动作测试、修订的六元素测试外, 各项评分及总标准分均有上升, 差异均有统计学意义( $P < 0.05$ ); 治疗6个月与治疗前比较, 各项评分及总标准分均有上升, 除修订的六元素测试外, 差异均有统计学意义( $P < 0.05$ ); 治疗6个月与治疗3个月比较, 除搜索钥匙测试, 各项评分及总标准分均有上升, 时间判断测试及总标准分差异均有统计学意义( $P < 0.05$ )。对照组: 治疗3个月时与治疗前比较, 各项评分及总标准分均有上升, 但差异无统计学意义( $P > 0.05$ ); 治疗6个月时与治疗前比较, 除时间判断测试、动物园分布图测试评分有上升外, 其余各项评分及总标准分均下降, 但差异无统计学意义( $P > 0.05$ ); 治疗6个月时与治疗3个月时比较, 各项评分均有下降, 但差异无统计学意义( $P > 0.05$ )。组间比较: 治疗3个月时除程序性动作测试外, 治疗组的各项评分及总标准分均高于对照组, 2组的规则转换卡片测试和时间判断测试的总标准分比较, 差异亦有统计学意义( $P < 0.05$ ); 治疗6个月时治疗组各项评分及总标准分均高于对照组, 除程序性动作测试外, 2组差异均有统计学意义( $P < 0.05$ )。结论执行功能干预措施综合治疗有效, 可延缓中老年脑梗死患者的执行功能障碍进展和改善预后, 长期坚持治疗效果良好。

关键词: 脑梗死; 执行功能干预; 认知功能障碍

[Download Fulltext](#)

**Fund Project:**

**Abstract:**

**Keywords:**

版权归《中华物理医学与康复杂志》编辑部所有

本站原创及转载的文章、资料, 其版权均由本站及原作者或原刊载媒介所拥有;

未经版权所有人同意, 任何机构或者个人不得擅自将其作为商业用途。

地址: 武汉市解放大道1095号同济医院 邮编: 430030

电话: (027) 83662874 传真: 83663264 E-mail: cjpnr@tjh.tjmu.edu.cn

本系统由武汉市凯思科技发展有限公司设计开发